

2010年临床助理其它辅导：典型偏头痛诊断标准 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/650/2021_2022_2010_E5_B9_B4_E4_B8_B4_c22_650941.htm

典型偏头痛又叫有先兆的偏头痛。其诊断标准为：1.符合下述2项，发作至少2次。2.具有以下特征，至少3项：<http://ks.100test.com>（1）有局限性脑皮质或（和）脑干功能障碍的一个或一个以上的先兆症状；（2）至少有一个先兆症状，逐渐发展，持续4分钟以上；或有相继发生的两个或两个以上的症状；（3）先兆症状持续时间小于60分钟；（4）先兆症状与头痛发作间无间歇期。3.具有以下特征，一项以上：[百考试题论坛](#)（1）病史和体格检查不提示有器质性疾病证据；（2）病史和体格检查提示有某种器质性疾病可能性，但经相关的实验室检查已排除；（3）虽有某种器质性疾病，但偏头痛的初次发作与该疾病无密切关系。更多信息请访问：[临床助理医师网校](#) [百考试题论坛](#) [百考试题在线考试系统](#) 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com