

临床助理医师考试辅导：面神经炎的概述 PDF转换可能丢失
图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/651/2021_2022__E4_B8_B4_E5_BA_8A_E5_8A_A9_E7_c22_651010.htm 特发性面神经麻痹或Bell麻痹是茎乳孔内面神经非特异性炎症所致的周围性面瘫，又称面神经炎。特发性面神经麻痹或Bell麻痹是茎乳孔内面神经非特异性炎症所致的周围性面瘫，又称面神经炎。

一、临床表现

- 1.任何年龄均可发病，男性略多。通常急性起病，症状可于数小时或1~3天内达到高峰。
- 2.病初可伴有麻痹侧耳后乳突区、耳内或下颌角的疼痛。表现一侧表情肌完全性瘫痪，额纹消失，不能皱额蹙眉，眼裂变大，眼裂不能闭合或闭合不全，闭眼时瘫痪侧眼球向外方转动，显露白色巩膜，称Bell征；患侧鼻唇沟变浅，口角下垂，示齿时口角歪向健侧；口轮匝肌瘫痪使鼓气和吹口哨时漏气；颊肌瘫痪使食物易滞留于病侧齿颊之间。特发性面神经炎多为单侧性，偶见双侧，多为Guillain - Barre综合征。
- 3.由于起自膝状神经节的味觉纤维走行于面神经管内，继而与面神经分离，形成鼓索神经，后加入舌神经，支配舌前2/3的味觉。在鼓索参与面神经处以上的病变，即可出现同侧舌前2/3味觉丧失；如在发出镫骨肌支以上受损时，可出现同侧舌前2/3味觉丧失和听觉过敏；病变在膝状神经节时，除有周围性面瘫、舌前2/3味觉障碍、听觉过敏外，尚有患侧乳突部疼痛、耳郭和外耳道感觉减退，外耳道或鼓膜出现疱疹，称Hunt综合征。

二、治疗措施

面神经炎的治疗原则是改善局部血液循环，减轻面神经水肿，缓解神经受压，促进功能恢复。

- 1.皮质激素治疗急性期尽早使用一个疗程皮质激素治疗，可用地塞米松10

~ 15mg/d, 7~10天; 或服泼尼松, 初剂量为1mg/(kg.d), 顿服或分2次口服, 连续5天, 以后7~10日内逐渐减量。如系带状疱疹感染引起的Hunt综合征可口服无环鸟苷 (acyclovir) 5mg/kg, 3次/日, 连服7~10日。 2. B族维生素维生素B族药物可促进神经髓鞘的恢复, 维生素B1 100mg、维生素B12 500 μg, 均1次/日肌肉注射。 3. 氯苯氨丁酸 (baclofen) 应从小剂量开始逐渐增量, 可逐渐加至30~40mg/d, 每日分3次口服。 4. 理疗急性期在茎乳孔附近行医学教育|网搜集整理超短波透热疗法、红外线照射或局部热敷等有助于改善局部血循环, 消除神经水肿。恢复期可做碘离子透入疗法、针刺或电针治疗。 5. 预防眼部合并症。 6. 康复治疗。 7. 必要时可手术治疗。 特别推荐: #0000ff>2010年临床助理执业医师考试考后真题与答案 #0000ff>2010年临床助理执业医师考试成绩查询及合格分数线 更多信息请访问: #0000ff>临床助理医师网校 #0000ff>医师互动交流 #0000ff>百考试题在线题库 相关推荐: #0000ff>2010年临床助理辅导: 子宫收缩乏力的原因 #0000ff>2010年临床助理辅导: 子宫收缩乏力的临床特点和诊断 100Test 下载频道开通, 各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com