

临床助理医师考试重点：多形红斑的诊断 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/651/2021\\_2022\\_\\_E4\\_B8\\_B4\\_E5\\_BA\\_8A\\_E5\\_8A\\_A9\\_E7\\_c22\\_651021.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/651/2021_2022__E4_B8_B4_E5_BA_8A_E5_8A_A9_E7_c22_651021.htm)

本病为急性炎症性皮肤病，皮疹表现为多形性，常伴黏膜损害。重者有严重的黏膜和内脏损害。病因复杂，以变态反应为常见。一、临床表现

1.皮疹呈多形性，开始多为红斑，以后可出现风团、丘疹、结节或水疱、紫癜等。红斑大小如同扁豆或指甲盖，颜色鲜红，中心暗红或紫红，可相互融合。有些红斑中心可消退，形成环状，或出现重叠水疱，形如虹膜，颇具特征性。

2.皮损多对称分布于手足背部、掌跖，腕肘、膝、面颈及臀部。严重者泛发全身，可累及口、眼、外生殖器等黏膜，出现黏膜红肿、糜烂、溃疡等。3.自觉瘙痒或灼热感，常伴有轻重不等的全身症状，如疲乏、头痛、发热、关节痛等。

4.病程轻者1~2周，重者3~4周方可消退。常有季节性复发，以春秋季节多见。本病好发于青少年，尤以女性多见。二、诊断

1.根据水肿性多形性皮疹及好发部位，一般不难诊断，如有典型虹膜样皮疹，更易确诊。2.需与冻疮及荨麻疹鉴别，冻疮常表现为暗紫色水肿性斑片，边界不清，且极少在掌跖口腔部位。荨麻疹则发无定处，发生及消退迅速，疹形为单一风团，一般无水疱，自觉剧痒。特别推荐：

[#0000ff>2011年临床助理医师资格考试报名时间](#) [#0000ff>考试时间](#)

[#0000ff>2011年临床助理医师考试大纲](#) 相关推荐：

[#0000ff>2010年临床助理其它辅导：医师执业规则](#)

[#0000ff>2010年临床助理其它辅导：医师的考核](#) 更多信息请访问：

[#0000ff>临床助理医师网校](#) [#0000ff>医师互动交流](#)

#0000ff>百考试题在线题库 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)