

2011年中医助理医师：茧唇的诊断 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/651/2021\\_2022\\_2011\\_E5\\_B9\\_B4\\_E4\\_B8\\_AD\\_c22\\_651350.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/651/2021_2022_2011_E5_B9_B4_E4_B8_AD_c22_651350.htm)

初起时，以唇部出现可排除机械性、物理性、化学性损伤的无痛性肿块或溃疡为特征！本病多见于50岁以上男性。大多数发生于下唇的唇红缘部位，少数发生于下唇的外中三分之一交界处。发病与长期吸烟，尤其使用烟嘴及烟斗有关。口唇白斑、疣赘及皲裂等病变长期不愈与本病的发生也有一定关系。初起时，以唇部出现可排除机械性、物理性、化学性损伤的无痛性肿块或溃疡为特征。局部表现有3种情况：唇部结块如豆，逐渐增大，肿而坚硬，形如茧壳，继而溃破；唇部起圆形肿物，似乳头、蕈状突出，进一步溃烂似翻花，时流血水；唇部溃疡，周围呈堤状，底部发硬，肉似翻花。以上三者均可累及颌下而出现坚硬肿块。特别推荐：

[2011年中医助理医师考试报名须知](#)

[2011年中医助理医师考试大纲](#) 更多信息请访问

[2011中医助理医师无忧通关班](#) 相关链接：

[2011年中医助理医师：泄泻的诊断要点](#)

[2011年中医助理执业医师辅导：积滞的辨证论治](#) 欢迎进入 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

[www.100test.com](http://www.100test.com)