

2011年口腔执业医师：牙隐裂的诊断方法 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/651/2021_2022_2011_E5_B9_B4_E5_8F_A3_c22_651543.htm 牙隐裂的诊断方法：病史和症状、叩诊、温度测验、裂纹的染色检查、咬楔法！

- 1、病史和症状：较长期的咬合不适及咬在某一特殊部位时的剧烈疼痛。
- 2、叩诊：分别各个牙尖和各个方向的叩诊可以帮助患牙定位，叩痛显著处则为隐裂所在位置。
- 3、温度测验：当患牙对冷敏感时，以隐裂纹处最明显。
- 4、裂纹的染色检查：2.5%碘酊或其他染料类药物使牙面裂纹清晰可见。
- 5、咬楔法：将韧性物如棉签或小橡皮轮放在可疑隐裂处做咀嚼运动时，可以引起疼痛。当隐裂纹为近远中贯通走行时，避免用力咬楔致使患牙劈裂。

特别推荐：[2011年口腔执业医师资格考试报名时间](#) [网上报名须知](#) [2011年口腔执业医师考试大纲汇总](#) 更多信息请访问：[2011口腔执业医师考试考前网上辅导](#) 相关链接：[2011年口腔执业医师：牙髓增龄变化](#) [2011年口腔执业医师考试：牙周萎缩的表现](#) 欢迎进入 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com