

2011口腔执业医师考试辅导：阻滞麻醉(1) PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/651/2021_2022_2011_E5_8F_A3_E8_85_94_c22_651596.htm

上牙槽后神经阻滞麻醉方法之口内注射法！阻滞麻醉 阻滞麻醉是将局麻药液注射到神经干或其主要分支附近，以阻断神经末梢传入的刺激，使被阻断的神经分布区域产生麻醉效果的麻醉方法。 1.上牙槽后神经阻滞麻醉 又称上颌结节注射法。本法适用于上颌磨牙的拔除以及相应的颊侧龈、黏膜和上颌结节部的手术。 口内注射法：一般以上颌第二磨牙远中颊侧根部前庭沟作为进针点，对于上颌第二磨牙尚未萌出的儿童，则以第1磨牙的远中颊侧根部的前庭沟作为进针点，在上颌磨牙已缺失的患者，则以颧牙槽嵴部的前庭沟为进针点。注射针与上颌牙的长轴成45度角，向上后内方刺入，进针时针尖沿着上颌结节弧形表面滑动，深约2cm,回抽无血，即可注入麻醉药液1.5~2ml。注意针尖刺入不宜过深，以免刺破上颌结节后方的翼静脉丛，引起血肿。 麻醉区域及效果：除第-磨牙颊侧近中根外的同侧磨牙的牙髓、牙周膜、牙槽突及其颊侧的骨膜、牙龈黏膜。注意第一磨牙的颊侧近中根为上牙槽中神经支配，因此在拔除上颌第一磨牙或对其进行治疗时，尚需在第一磨牙近中根颊侧相应部位的移行沟黏膜转折处行浸润麻醉，麻醉效果才能完全。 特别推荐：>2011年口腔执业医师资格考试报名时间 >2011年口腔执业医师考试大纲汇总 更多信息请访问：>2011口腔执业医师考试考前网上辅导 相关链接：>2011口腔执业医师考试辅导：牙周炎发展过程 >2011口腔执业医师考试辅导：剥脱性龈病损 欢迎进入

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问
www.100test.com