

2011口腔执业医师考试备考：地高辛临床应用 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/651/2021_2022_2011_E5_8F_A3_E8_85_94_c22_651674.htm 讲述地高辛临床应用及不良反应

地高辛临床应用及不良反应 1)临床应用 治疗心力衰竭：多用于以收缩功能障碍为主，对利尿药、ACE抑制药、受体阻断药疗效欠佳者。对有心房纤颤伴心室率快的心力衰竭疗效最佳。对瓣膜病、风湿性心脏病(高度二尖瓣狭窄的病例除外)、冠状动脉粥样硬化性心脏病和高血压性心脏病所导致的心功能不全疗效较好。 治疗某些心律失常 A：心房纤颤：通过兴奋迷走神经或对房室结的直接作用减慢房室传导、增加房室结中隐匿性传导、减慢心室率、增加心排血量，从而改善循环障碍，但对多数患者并不能终止心房纤颤。 B：心房扑动：是治疗心房扑动最常用的药物。 C：阵发性室上性心动过速：降低心房的兴奋性而终止阵发性室上性心动过速的发作。 2)不良反应：强心苷治疗安全范围小，个体差异较大，故易发生不同程度的毒性反应。 心脏反应：是强心苷最严重、最危险的不良反应。 A：快速型心律失常：强心苷中毒最多见和最早见的是室性早搏。 B：房室传导阻滞：引起的房室传导阻滞除与提高迷走神经兴奋性有关外，还与高度抑制Na⁺-K⁺ATP酶有关。 C：窦性心动过缓：一般应作为停药指征之一。 胃肠道反应：是最常见的早期中毒症状。主要表现为厌食、恶心、呕吐及腹泻等。 中枢神经系统反应：主要表现为眩晕、头痛、失眠、疲倦和谵妄等症状及视觉障碍。视觉异常通常是强心苷中毒的先兆，可作为停药的指征。 特别推荐：#0000ff>2010年执业医师笔试考试成绩查

询及合格分数线 #0000ff>2010年执业医师笔试考试成绩查询汇总 #0000ff>2009年执业医师考试成绩查询及合格分数线 相关推荐： #0000ff>2011口腔执业医师考试辅导：抗心律失常药 #0000ff>2011口腔医师考试辅导：抗心律失常药的分类 更多信息请访问：#0000ff>口腔执业医师网校 #0000ff>医师互动交流 #0000ff>百考试题在线题库 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com