

2011年临床执业医师：地方性甲状腺肿预防措施 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/651/2021_2022_2011_E5_B9_B4_E4_B8_B4_c22_651920.htm

地方性甲状腺肿预防措施：碘化食盐、碘化饮水、碘油注射！
碘化食盐：食盐中加入碘化钠或碘化钾，浓度为1 1万至1 2万。
碘化饮水：饮水中加入碘化钾，按10万L水加碘化钾1g（即每升水含碘化钾10 μg）。
碘油注射适用于发病率低，无须普遍加碘的地区。
注射碘油剂量，1岁以下125mg；1~5岁250mg；6~10岁750mg；10岁以上及成人，1000mg。
多吃含碘丰富的食物，如海带、紫菜、海藻、海鱼虾等。特别推荐：

#0000ff>2011年临床执业医师考试报名时间 #0000ff>网上报名须知 #0000ff>2011年临床执业医师考试大纲 更多信息请访问

：#0000ff>2011年临床执业医师考试网校辅导 相关链接：

#0000ff>2011年临床执业医师：泌乳素瘤的临床表现

#0000ff>2011年临床执业医师：卡氏肺囊虫肺炎治疗和症状 欢迎进入 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com