

2011年临床执业医师考试：母乳性黄疸早期症状 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/651/2021_2022_2011_E5_B9_B4_E4_B8_B4_c22_651988.htm

母乳性黄疸早期症状有：黄疸不消退在生理性黄疸期间，般情况好婴儿除黄疸外完全健康，停母乳后黄疸迅速消退停母乳48～72h后黄疸明显减轻！特征为新生儿以母乳喂养后不久即出现黄疸，可持续数周到数月，而其他方面正常。分为早发型（母乳喂养性黄疸）和晚发型（母乳性黄疸），早发型与新生儿生理性黄疸的出现时间及达到高峰值的时间相似，但母乳性黄疸的最高值要超过生理性黄疸；迟发型者常在生理性黄疸之后黄疸渐趋明显，也就是说母乳性黄疸常在出生后7～14天出现。无论是早发型或迟发型母乳性黄疸，一旦停喂母乳3～5天后，黄疸减退；若再开始母乳喂养，大多黄疸不再出现，少数黄疸又会重新出现。随着月龄的增长，黄疸可逐渐消退，有如下特点：1. 黄疸不消退在生理性黄疸期间，即出生后2天～2周发生，但不随生理性黄疸的消失而消失。2. 黄疸程度以轻、中度为主（ $342 \mu\text{mol/L}$ ），重度少见，以未结合胆红素升高多见。3. 一般情况好婴儿除黄疸外完全健康，吃奶好、大小便正常、体重增长满意、肝脾不大、肝功能正常、HBsAg阴性。4. 停母乳后黄疸迅速消退停母乳48～72h后黄疸明显减轻，胆红素迅速下降为原水平的50%左右，重新哺乳，血清胆红素将在1～2天内回升 $17.1 \sim 51.3 \mu\text{mol/L}$ （ $1 \sim 3\text{mg/dl}$ ），然后持续一段时间后缓慢下降。不停母乳胆红素也会自行降至正常。

特别推荐：#0000ff>2011年临床执业医师考试报名时间

#0000ff>网上报名须知 #0000ff>2011年临床执业医师考试大纲

更多信息请访问：[#0000ff>2011年临床执业医师考试网校辅导](#)
相关链接：[#0000ff>2011年临床医师外科辅导：创伤性鼻出血](#)
[早期症状](#) [#0000ff>2011年临床医师外科辅导：肝小静脉闭塞症](#)
[早期症状](#) 欢迎进入 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接
下载。详细请访问 www.100test.com