

2011年临床执业医师考试：卵巢破裂病因 PDF转换可能丢失
图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/651/2021_2022_2011_E5_B9_B4_E4_B8_B4_c22_651992.htm

卵巢破裂病因：自发性破裂、
卵巢直接或间接受外力影响而发生破裂！（一）自发性破裂：
即卵泡血肿或黄体血肿继续扩大，内压增加至一定程度即发生破裂。其发生又有几种诱因：与卵巢充血有密切关系，如卵巢因压迫扭转或子宫脱垂，长期阴道灌洗等机械性因素或盆腔炎症，急、慢性阑尾炎所引起的卵巢充血；卵巢功能变化，如过分的冷、热浴，长期应用雌激素或孕激素均能引起卵巢的功能变化，或因植物神经系统的影响引起卵巢酶系统的功能过度活跃，造成出血倾向或凝血障碍；血液变化，月经前因传染病、贫血及营养不良或其他情况引起血小板部分损害及血液成分改变，导致出血。（二）卵巢直接或间接受外力影响而发生破裂，如性交、腹内压增加（大便秘用力、恶心、呕吐、举重物等）。特别推荐：[#0000ff>2011年临床执业医师考试报名须知](#)
[#0000ff>2011年临床执业医师考试大纲](#) 更多信息请访问：
[#0000ff>2011年临床执业医师考试网校辅导](#) 相关链接：
[#0000ff>2011年临床执业医师考试：急性女阴溃疡汇总](#)
[#0000ff>2011年临床执业医师考试要点：宫颈外翻汇总](#) 欢迎进入 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com