

2011年临床执业医师考试辅导：羊痘的临床诊断 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/652/2021\\_2022\\_2011\\_E5\\_B9\\_B4\\_E4\\_B8\\_B4\\_c22\\_652007.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/652/2021_2022_2011_E5_B9_B4_E4_B8_B4_c22_652007.htm)

绵羊痘的潜伏期为4~12天，结膜眼睑红肿，呼吸和脉搏加快，鼻流粘液，食欲丧失，弓背站立，经1~2天后发痘；山羊痘的潜伏期为6~8天，食欲减退或不食，病初鼻孔闭塞、脉搏和呼吸加快，眼睑肿胀、结膜充血、有浆液性分泌物，经1~2日后无毛部位出现块状疹

！绵羊痘的潜伏期为4~12天，平均为6~8天。病羊体温升高达41~42℃，结膜眼睑红肿，呼吸和脉搏加快，鼻流粘液，食欲丧失，弓背站立，经1~2天后发痘，痘疹多长于皮肤无毛或少毛处，先出现红斑，后变成丘疹再逐渐形成水疱，最后变成脓疱，脓疱破溃后，若无继发感染逐渐干燥，形成痂皮，经2~3周痊愈。发生在舌和齿龈的痘疹往往形成溃疡，有的咽喉、支气管，肺脏和前胃或真胃黏膜上发生痘疹时，病羊可因继发细菌或病毒感染，而死于败血症。有的病羊见痘疹内出血，呈黑色痘。还有的病例痘疹发生化脓和坏疽，形成深层溃疡，发出恶臭，常为恶性经过，病死率高达20%~50%以上。山羊痘的潜伏期为6~8天，病羊发热，体温升高达40~42℃，精神不振，食欲减退或不食，病初鼻孔闭塞、脉搏和呼吸加快，偶有咳嗽，有的山羊流浆液或粘液性鼻涕，眼睑肿胀、结膜充血、有浆液性分泌物，经1~2日后，在无毛部位例如鼻孔周围、面部、耳部、背部、胸腹部、四肢无毛区，有两分至一元钱硬币大小的块状疹，疹块破溃后，有淡黄色液体流出，经3~4日后，没有破溃的脓疱渐渐被吸收，干缩，结成褐色痂。再过几天后，痂皮脱落，遗留色

较淡的疤痕即愈合，全过程为3~4周。山羊痘可并发呼吸道、消化道疾病和关节炎，严重时可引起脓毒败血症而死亡。

特别推荐：[#0000ff>2011年临床执业医师考试报名时间](#)  
[#0000ff>2011年临床执业医师考试大纲](#) 更多信息请访问  
：[#0000ff>2011年临床执业医师考试网校辅导](#) 相关链接：  
[#0000ff>2011年诊断基础：肝性脑病的诊断依据](#) [#0000ff>2011年诊断基础：鼻咽癌的临床鉴别诊断](#) 欢迎进入 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问  
[www.100test.com](http://www.100test.com)