

2010年临床病理生理辅导：无性细胞瘤病理变化 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/652/2021\\_2022\\_2010\\_E5\\_B9\\_B4\\_E4\\_B8\\_B4\\_c22\\_652077.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/652/2021_2022_2010_E5_B9_B4_E4_B8_B4_c22_652077.htm)

**卵巢无性细胞瘤**：瘤细胞大小较为一致，胞浆丰富、透明，核圆居中，其间伴有散在的淋巴细胞浸润。无性细胞瘤对放疗和化疗敏感，五年生存率可达80%以上。卵巢无性细胞瘤是由未分化、多潜能原始生殖细胞组成的恶性肿瘤，同一肿瘤发生在睾丸则称为精原细胞瘤。大多数病人的年龄在10-30岁之间。无性细胞瘤仅占卵巢恶性肿瘤的2%，精原细胞瘤则是睾丸最常见的肿瘤。肉眼观，肿瘤一般体积较大，质实，表面结节状。切面质软，鱼肉样。镜下，细胞体积大而一致，细胞膜清晰，胞浆空亮，充满糖原，细胞核居中，有1-2个明显的核仁，核分裂多见。瘤细胞排列成巢状或条索状。瘤细胞巢周围的纤维间隔中常有淋巴细胞浸润，并可有结核样肉芽肿结构。约15%的无性细胞瘤含有和胎盘合体细胞相似的合体细胞滋养层成分。肿瘤细胞胎盘碱性磷酸酶阳性可有助于诊断的确立。

**卵巢无性细胞瘤**：瘤细胞大小较为一致，胞浆丰富、透明，核圆居中，其间伴有散在的淋巴细胞浸润。无性细胞瘤对放疗和化疗敏感，五年生存率可达80%以上。晚期主要经淋巴道转移至髂部和主动脉旁淋巴结。

特别推荐：[#0000ff>2010年临床执业医师笔试考试成绩查询汇总](#) [#0000ff>2010年临床执业医师考试考后真题与答案](#) [更多信息请访问：#0000ff>临床执业医师网校](#) [#0000ff>医师互动交流](#) [#0000ff>百考试题在线题库](#) 相关推荐：[#0000ff>2010年临床病理生理辅导：应激与内分泌功能障碍](#) [#0000ff>2010年临床病理生理辅导：应激与心血管疾病](#) 100Test

下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问  
[www.100test.com](http://www.100test.com)