

2011年解剖学辅导：腹后壁的皱襞和隐窝 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/652/2021_2022_2011_E5_B9_B4_E8_A7_A3_c22_652101.htm

腹后壁的皱襞和隐窝：在胃后方、十二指肠、盲肠和乙状结肠系膜附近有较多的皱襞和隐窝，其大小和深浅可随年龄不同或腹膜外脂肪的多少而变化。在胃后方、十二指肠、盲肠和乙状结肠系膜附近有较多的皱襞和隐窝，其大小和深浅可随年龄不同或腹膜外脂肪的多少而变化。十二指肠上囊位于十二指肠升部左侧，相当第2腰椎平面，呈半月形，下缘游离。皱襞深面为口向下方的十二指肠上隐窝（国人50%有此窝），其左侧有肠系膜下静脉通行于壁腹膜深面。此隐窝下方有三角形的十二指肠下襞，其上缘游离。此皱襞深面为口向上的十二指肠下隐窝（国人75%存在）。盲肠后隐窝位于盲肠后方，盲肠后位的阑尾常位于其内。乙状结肠间隐窝位于乙状结肠左后方，在乙状结肠系膜与腹后壁之间，其后壁内有左输尿管经过。肝肾隐窝hepatorenalrecess位于肝右叶下方与右肾之间，仰卧时为腹膜腔最低处，是液体易于积聚的部位。在腹膜皱襞和隐窝较发达处可为内疝好发部位。特别推荐：[#0000ff>2010年执业医师笔试考试成绩查询及合格分数线](#) [#0000ff>2010年执业医师笔试考试成绩查询汇总](#) [#0000ff>2009年执业医师考试成绩查询及合格分数线](#) 相关推荐：[#0000ff>2010年解剖学辅导：骶丛的解剖结构](#) [#0000ff>2010年解剖学辅导：腰丛的解剖结构](#) 更多信息请访问：[#0000ff>临床执业医师网校](#) [#0000ff>医师互动交流](#) [#0000ff>百考试题在线题库](#) 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com