

2011年临床助理医师：非哺乳期乳晕部瘻管早期症状 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/652/2021\\_2022\\_2011\\_E5\\_B9\\_B4\\_E4\\_B8\\_B4\\_c22\\_652130.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/652/2021_2022_2011_E5_B9_B4_E4_B8_B4_c22_652130.htm) 非哺乳期乳晕部瘻管早期症状

：无痛性肿块、乳头内陷、复发性瘻管！（1）无痛性肿块：乳晕区形成慢性脓肿在未穿破或切开之前，局部皮肤多无炎性表现，仅能触及边界较清楚的无痛性肿块。（2）乳头内陷：

大部分病例伴有乳头内陷，乳头内陷多偏向患侧

（87%~92.3%），又称为“偏向性内陷”。（3）复发性瘻管：脓肿穿破或切开之后，可有皮脂样分泌物排出；破溃口经久不愈，或反复发生脓肿和破溃，形成局部反复切开引流

愈合 破溃 再愈合 再破溃。特别推荐：[#0000ff>2011年临床助理医师资格考试报名时间](#) [#0000ff>网上报名须知](#)

[#0000ff>2011年临床助理医师考试现场报名时间](#) [#0000ff>考试时间](#) [#0000ff>2011年临床助理医师考试大纲](#) 更多信息请访问

：[#0000ff>2011临床助理医师精品班](#) 相关链接：[#0000ff>2011](#)

[年临床助理医师考试：月经疹汇总](#) [#0000ff>2011年临床助理医师考试辅导：功血汇总](#) 欢迎进入 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)