

2011年临床助理医师：非哺乳期乳晕部瘻管体检 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/652/2021_2022_2011_E5_B9_B4_E4_B8_B4_c22_652131.htm

触诊乳晕或乳头根部有条索状物。局麻下经溃疡或穿破脓肿以金属探针轻柔地向乳头方向探查，可经乳管开口探出！触诊乳晕或乳头根部有条索状物。

局麻下经溃疡或穿破脓肿以金属探针轻柔地向乳头方向探查，可经乳管开口探出。如不能探出时，可用钝头软塑料管（输液针头连带的塑料管或用直径1mm的硬膜外导管代替）

多方向探查明确诊断。下列临床特点是诊断本病的依据：1. 非哺乳期乳晕部的反复感染、脓肿、乳头溢脓。2. 脓肿形成 切开 愈合 再破溃 再愈合。3. 抗生素治疗无效，切开引流或切除瘻管愈合是与癌的鉴别要点。4. 经脓肿破溃处插入探针，或注入亚甲蓝，可在乳管开口探出或溢出。特别推荐：

#0000ff>2011年临床助理医师资格考试报名时间 #0000ff>网上报名须知 #0000ff>2011年临床助理医师考试现场报名时间 #0000ff>考试时间 #0000ff>2011年临床助理医师考试大纲 更多信息请访问：#0000ff>2011临床助理医师精品班 相关链接：

#0000ff>2011年临床助理医师考试：月经疹汇总 #0000ff>2011年临床助理医师考试辅导：功血汇总 欢迎进入 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

www.100test.com