

2011年口腔助理医师：巨细胞性龈瘤 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/652/2021_2022_2011_E5_B9_B4_E5_8F_A3_c22_652201.htm

巨细胞性龈瘤病变发生牙间区者，颊和舌侧肿物牙间狭窄带相连形成一种时漏状外观！巨细胞性龈瘤又称外周性巨细胞肉芽肿，以30～40岁多见，也可以发生于青年人和老年人。以前牙区多见，上颌较下颌多，位于牙龈或牙槽粘膜，女性较男性多见，包块有蒂或无蒂，呈暗红色，可发生溃疡。病变发生牙间区者，颊和舌侧肿物牙间狭窄带相连形成一种时漏状外观。镜下见，富于血管和细胞的间质内含有多核破骨细胞样细胞，呈灶性聚集，灶之间有纤维间隔，巨细胞数量多，大小和形态不一，毛细血管丰富，常见出血灶及含铁血黄素沉着，单核间质细胞呈卵圆形或梭形，在超微结构上与成纤维细胞、巨噬细胞和未分化间充质细胞相似，病变内偶见少许骨小梁或骨样组织。巨细胞性龈瘤的发病机制不清，但一般认为它是一种反应性增生，损伤可能是重要的病因。组织发生上，可能来源于骨膜而不是牙龈，因为病损可引起骨表面缺损，且可发生于无牙的颌骨区。巨细胞的来源不明，可能来自周围间质内单核细胞前体的融合，也有人认为它是破骨细胞。特别推荐：

#0000ff>2011年口腔助理医师资格考试报名时间 #0000ff>报名条件

#0000ff>2011年口腔助理医师大纲汇总 更多信息请访问

：#0000ff>2011口腔助理医师网上辅导 相关链接：

#0000ff>2011年口腔助理医师辅导：氟牙汇总 #0000ff>2011年

口腔助理医师考试：龋病的治疗汇总 欢迎进入 100Test 下载频道

开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

