

2011年临床助理医师：疱疹的分类诊断 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/652/2021_2022_2011_E5_B9_B4_E4_B8_B4_c22_652245.htm 疱疹的分类诊断：带状疱疹和生殖器疱疹的鉴别诊断、单纯性疱疹的症状、单纯疱疹病毒构成、生殖器疱疹，生殖器疱疹症状、疱疹诊断要点！带状疱疹和生殖器疱疹的鉴别诊断 疱疹带状疱疹是由带状疱疹病毒引起的急性炎症性皮肤病。可发生于身体的任何一个部位，但以腰背部为多见。带状疱疹是由过滤性病毒、外伤、梅毒、脊髓疾病、砒霜中毒引起的。带状疱疹初起时患部往往有瘙痒、灼热或疼痛的感觉，有时还伴有全身不适、发热、食欲不振等前期症状，带状疱疹病毒常常在初次原发感染后表现为水痘，通常出现在儿童患者中再次或继发感染病毒后即带状疱疹，水痘发作时，会发生刀割般的疾痛（神经痛），并会在病原神经的皮肤上引发水泡似的疹子。不断有新疹出现，新旧疹群依神经行走分布，排列呈带状，疹群之间皮肤正常，带状疱疹影响到颜面神经，患者会发生颜面麻痹，如果影响到眼睛，角膜会受损。生殖器疱疹多发生在皮肤和粘膜的交界处，先是局部皮肤轻度发红，继而发出成群的像针尖大小的小水疱，有轻度发痒和烧灼的感觉，几天后就变干而结成棕色的痂，痂脱落后有轻微的色素沉着，但也很快就消失，全部病程平均一星期，但常见复发。单纯性疱疹的症状 单纯性疱疹亦称为发热性水疱，是由单纯疱疹病毒所致的疼痛性感染，他可以在全身出现，但最常见于牙龈上、口腔外侧、嘴唇外侧、鼻子、颊或手指上。水疱形成后，破损产生渗出液，其后产生黄白色的痂壳最终脱落。在痂壳的

下面产生新的皮肤。溃疡通常持续7~10天。 症状：单纯疱疹常见龄口炎，起病时局部先呈充血，随即发生圆形小泡，破裂后成浅表溃疡，内含微量纤维性渗出物。 单纯疱疹病毒构成 单纯疱疹病毒直径约为120~150微米，由含有DNA的核于中间，向外依次由包膜、体被、衣壳三种同心结构组成，衣壳表面为162个壳微粒组成的3：3：2轴对称的20面体，体被由纤维质构成，包膜有时来自细胞核，有时来自细胞膜，细胞膜内含有脂成份，所以单纯疱疹病毒对乙醚及脂溶剂特别敏感。对高温和低PH都不稳定，在低温下可生存数月，湿热50℃及干燥90℃30分钟灭活。 生殖器疱疹，生殖器疱疹症状 生殖器疱疹是由单纯疱疹病毒 I 型、II 型所致性病之一，可引起皮肤、粘膜及多种器官感染。它可以通过性接触感染而发生生殖器疱疹。近年来发病率明显升高。在国内它还属性病中新一代成员，人们对它的危害性没有足够的认识。 症状：生殖器疱疹的患部先有烧灼感，很快在红斑的基础上发生成群的小水疱，多见男性包皮、龟头、冠状沟、阴茎等处，偶见于尿道；女性常见于阴唇、阴蒂、阴道、宫颈等处。 疱疹诊断要点 1、损害为密集成群的针尖大小的水疱，常为一群，亦有2-3群，破裂后露出糜烂面，逐渐干燥结痂。自觉烧灼和痒感。 2、多发生于皮肤、粘膜交界处、以颜面及生殖器为多见，如口角、唇缘、眼睑、包皮、龟头、尿道、阴唇、及外阴阴道等部位。 3、重者常引起附近淋巴结肿大。 4、历时1周左右自愈、可反复发作。 特别推荐：#0000ff>2011年临床助理医师资格考试报名时间 #0000ff>网上报名须知 #0000ff>2011年临床助理医师考试现场报名时间 #0000ff>考试时间 #0000ff>2011年临床助理医师考试大纲 更多信息请访问

：#0000ff>2011临床助理医师精品班 相关链接：#0000ff>2011年临床助理医师考试：意志行为障碍汇总 #0000ff>2011年临床助理医师：肛管癌早期诊断 欢迎进入 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com