

2011年口腔助理医师：阻生齿尽早拔 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/652/2021_2022_2011_E5_B9_B4_E5_8F_A3_c22_652368.htm

下颌智齿一旦发生阻生，迟早会引起各种病变！一般地说，成人长出恒牙共有三十三颗，上下颌各十六颗。长在最边上的称为第三磨牙，又称智齿，这个牙是恒牙中最后萌出的牙齿，通常要在17~21岁时才长出来。随着人类不断进化人体颌骨的逐渐变小，当轮到最后一颗牙要萌出时，颌骨所留下的空位已不多了，很难让它正常萌出，这就造成了“阻生牙”。据统计，成人中阻生牙至少占20%。这种阻生齿和覆盖在它上面的牙龈之间，很容易藏污纳垢，孳生细菌，引起口臭及磨牙龋坏，当身体抵抗力下降时，智齿的牙龈常常会发生炎症，这就是医学上说的冠周炎。下颌智齿一旦发生阻生，迟早会引起各种病变，因此，绝大多数阻生智齿最好能在17~18岁时拔除，至少在尚未继发严重病变时（20岁左右）作预防拔除。若能早期拔除，创伤小，愈合快，拔牙并发症也少。如果在急性冠周炎发生时，应先治疗急性炎症，待炎症缓解后再拔牙。拔除智齿并不影响咀嚼，也不需要再镶假牙。但阻生智齿牙根还未完成形成，而第一或第二磨牙龋坏严重不能保留，可作牙移植术，即把阻生智齿移植到第一或第二磨牙位置。特别推荐：
#0000ff>2011年口腔助理医师资格考试报名时间 #0000ff>报名条件 #0000ff>2011年口腔助理医师大纲汇总 更多信息请访问：
#0000ff>2011口腔助理医师网上辅导 相关链接：
#0000ff>2011年口腔助理医师辅导：氟牙汇总 #0000ff>2011年口腔助理医师考试：龋病的治疗汇总 欢迎进入 100Test 下载频

道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

www.100test.com