

2011年口腔执业医师：牙脱位的并发症 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/652/2021_2022_2011_E5_B9_B4_E5_8F_A3_c22_652443.htm

牙脱位的并发症：牙髓坏死、牙髓腔变窄或消失、牙根外吸收、边缘性牙槽突吸收！

- 1、牙髓坏死 其发生率占牙脱位的52%，占嵌入性脱位的96%.
- 2、牙髓腔变窄或消失 发生率占牙脱位的20%~25%.牙髓腔内钙化组织加速形成，是轻度牙脱位的反应；严重的牙脱位常导致牙髓坏死。
- 3、牙根外吸收 有人认为坏死牙髓的存在能促使牙根的外吸收。牙根吸收最早在受伤2个月后发生，此外，约有2%的病例并发牙内吸收。
- 4、边缘性牙槽突吸收 嵌入性和合向性脱位牙特别易丧失边缘牙槽突。

特别推荐：

[#0000ff>2011年口腔执业医师资格考试报名时间](#) [#0000ff>网上报名须知](#)

[#0000ff>2011年口腔执业医师考试大纲汇总](#) [更多信息](#)

[#0000ff>2011口腔执业医师考试考前网上辅导](#) [相关链接](#)：

[#0000ff>2011年口腔执业医师：牙髓切断术治疗](#)

[#0000ff>2011年口腔执业医师：根管治疗根尖预备法](#) [欢迎进入](#)

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

www.100test.com