

2011年中医助理医师：痄腮的诊断治疗 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/652/2021_2022_2011_E5_B9_B4_E4_B8_AD_c22_652579.htm 痄腮的治疗，着重于清热解毒

，佐以软坚散结！【临床诊断】一、诊断要点 1.当地有腮腺炎流行，发病前23周有流行性腮腺炎接触史。 2.临床表现初病时可有发热，12天后，以耳垂为中心腮部漫肿，边缘不清，皮色不红，压之疼痛或有弹性，通常先发于一侧，继发于另一侧。口腔内颊粘膜腮腺管口可见红肿。 3.腮腺肿胀约经4-5天开始消退，整个病程约1-2周。 4.常见并发症有睾丸炎、卵巢炎、胰腺炎等，也有并发脑膜炎者。 5.实验室检查周围血象白细胞总数正常或降低，淋巴细胞相对增多。尿、血淀粉酶增多。 二、鉴别诊断 发颐两颊肿胀疼痛，表皮泛红，腮腺化脓，按摩腮部可见口腔内腮腺管口有脓液溢出。多为一侧腮部肿痛，无传染性，常继发于热病之后，又称化脓性腮腺炎。【辨证论治】一、辨证要点 痄腮的辨证要点主要是辨别轻证重证。轻证不发热或发热不甚，腮肿不坚硬，属温毒在表；重证发热高，腮肿坚硬，胀痛拒按，属热毒在里。若出现高热不退，神识昏迷，反复抽风，或睾丸胀痛，少腹疼痛等并发症者，为变证。 二、治疗原则 本病治疗，着重于清热解毒，佐以软坚散结。初起温毒在表者，以疏风清热为主，若病情较重，热毒壅盛者，治宜清热解毒为主。腮肿硬结不散，治宜软坚散结，清热化痰。软坚散结只可用宣、通之剂，以去其壅滞，不要过于攻伐，壅滞既去，则风散毒解，自然会达到消肿止痛的目的。对于病情严重出现变证，如邪陷心肝，或毒窜睾腹，则按熄风开窍或清肝泻火等法治之

。 本病治疗应内服药与外治疗法配合应用，有助于局部消肿
。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com