

2011年临床助理医师：卵巢成熟畸胎瘤X线诊断 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/652/2021_2022_2011_E5_B9_B4_E4_B8_B4_c22_652734.htm

成熟畸胎瘤内因常有油脂样物、牙及骨片等，故在腹部或盆腔X线摄片时可显示一些特点，如骨片及牙阴影、囊内容钙化影等！Josephsen于1915年首先经放射线检查确诊该肿瘤后，目前已将该方法作为常规术前检查。成熟畸胎瘤内因常有油脂样物、牙及骨片等，故在腹部或盆腔X线摄片时可显示一些特点，如骨片及牙阴影、囊内容钙化影等。如囊内容物仅仅为皮脂物质及毛发，则表现为透光度减弱或呈现轮廓清晰的圆形或卵圆形阴影。研究表明，成熟畸胎瘤X线检查时，41%~62%可显示出以上协助诊断的特点，为避免与肠襻内气体混淆，在摄片前应进行通便或洗肠。另外，还应与盆腔内X线密度增加的病变进行鉴别，如子宫肌瘤、卵巢纤维瘤、输尿管结石及钙化淋巴结等。特别推荐：[#0000ff>现场报名时间汇总](#) [#0000ff>2011年临床助理医师考试时间](#) [#0000ff>2011年临床助理医师考试大纲](#) 更多信息请访问：[#0000ff>2011临床助理医师精品班](#) 相关推荐：[#0000ff>2011年临床助理医师：霉菌性阴道的诊断](#) [#0000ff>2011年临床助理医师：卵巢肿瘤的常见并发症](#) [#0000ff>2011年临床助理医师考试：附件炎汇总](#) 欢迎进入100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问www.100test.com