

2011年临床执业医师：分娩先兆 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/652/2021_2022_2011_E5_B9_B4_E4_B8_B4_c22_652839.htm

分娩先兆：不规律宫缩、上腹轻松感、血性分泌物！（一）不规律宫缩 分娩尚未发动，孕妇常出现不规律宫缩，其特点是收缩力弱，持续时间短，常少于30秒，且不规律，强度也不逐渐增加。常在夜间出现，清晨消失。宫颈管不随宫缩而消失及扩张，给予镇静剂能抑制其发生。（二）上腹轻松感 初产妇多有上腹轻松感，进食增多，呼吸轻快，系因胎先露进入骨盆入口，使子宫底下降的缘故。（三）血性分泌物 在分娩开始前24~28小时，因子宫颈内口附近的胎膜与该处的子宫壁分离，毛细血管破裂而经阴道排出少量血液，又由于宫颈管开始开大，子宫颈管内原有的粘液栓与少量血液相混而排出，称为见红。是分娩即将开始的一个比较可靠的征象。 特别推荐：[#0000ff>现场报名时间汇总](#)

[#0000ff>2011年临床执业医师考试时间](#)

[#0000ff>2011年临床执业医师考试大纲](#) 更多信息请访问

[#0000ff>2011年临床执业医师考试网校辅导](#) 相关推荐：

[#0000ff>2011年临床执业医师考试：创伤性气胸汇总](#)

[#0000ff>2011年临床执业医师辅导：颅骨骨膜窦汇总](#)

[#0000ff>2011年临床执业医师辅导：急性失血所致贫血汇总](#) 欢迎进入 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细

请访问 www.100test.com