

2011年临床执业医师：双侧肾缺如治疗 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/653/2021\\_2022\\_2011\\_E5\\_B9\\_B4\\_E4\\_B8\\_B4\\_c22\\_653031.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/653/2021_2022_2011_E5_B9_B4_E4_B8_B4_c22_653031.htm) (一) 治疗 目前暂无相关资料

(二) 预后 约40%的胎儿出生时即死胎，大多的新生儿出生后由于肺的发育不良而引起呼吸衰竭，多在24~48h内死亡。其他的患儿其存活期的长短主要取决于肾功能的损伤程度。

据报道BRA最长生存时间为39天。相关推荐：[2011年临床执业医师：大肠息肉的治疗](#)

[2011年临床执业医师：川崎病的急性期治疗](#)

[2011年临床执业医师：血友病乙治疗前的注意事项](#)

[2011年临床执业医师：低血压注意事项](#)

特别推荐：[2011年临床执业医师考试时间](#)

[2011年临床执业医师考试大纲](#) 欢迎进入 100Test 下载频道开通，各类考试

题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)