

2011年口腔执业医师：牙颌畸形的外科矫正 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/653/2021\\_2022\\_2011\\_E5\\_B9\\_B4\\_E5\\_8F\\_A3\\_c22\\_653101.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/653/2021_2022_2011_E5_B9_B4_E5_8F_A3_c22_653101.htm) 牙颌畸形的治疗方法多种，在大致上分预防性矫治，阻断性矫治，正畸矫治和外科矫治四种！牙颌畸形的发生率很高，约为50%左右。顾名思义，这种畸形包含牙和颌骨两种，其表现为牙排列异常，咬合不整，牙弓、颌骨的大小形态和位置的异常。这种过去被老百姓视为“不是病”的病，其对人体的危害除了妨碍咬合功能外，还不同程度影响容貌美。只有在经济发展到一定程度，大家的温饱问题已经解决，这种“病”的治疗才有市场。牙颌畸形的治疗方法多种，在大致上分预防性矫治，阻断性矫治，正畸矫治和外科矫治四种。前两种矫治方法主要用于新生儿和少年儿童时期，通过一些矫治器戴用，使正在快速生长发育期的某种引起牙齿和颌骨畸形的习惯去除，阻断正在发生的畸形。而正畸治疗是我们最常见的临床口腔正畸方法，主要用在青少年，常采用固定“箍牙”方式，这时患者的颌骨尚处于生长发育期，一些主要为骨性畸形者还可以通过这种方法得以治疗，但在颌骨生长发育期过后，这些颌骨源性的畸形只有采用外科正畸的方法才能解决。外科矫正牙颌畸形具有一般正畸方法无可比拟的优点，对“地包天”、“哨牙”甚至是颌骨的不对称畸形都是“轻而易举”的，其治疗牙颌畸形的种类比一般的正畸方法多；其次是“快”：常规的正畸治疗通常要2年左右，但外科正畸手术时间只需一两个小时，一周拆线即可；然后是“好”：一般的正畸方法移动牙齿或颌骨的距离是有限的，而外科正畸可以较大范围内搬

动牙和骨头，从而取得比较和谐的容貌美；最后是“省”：现代正颌外科发展到现在，无论在基础理论研究，还是在临床应用技术发展，都有了长足的进步，她可以很好地体贴现代人惜时如金的心理，省却了人们繁琐的多次复诊，实为一种与时俱进的现代颜面美容整形的好方法。 小编推荐：  
#0000ff>2011年口腔执业医师：敏感牙本质 #0000ff>2011年口腔执业医师：牙周病的局部因素 #0000ff>2011年口腔执业医师：慢性糜烂性唇炎治疗法 特别推荐：[blue>2011口腔执业医师考试时间](#) #0000ff>[考试大纲](#) 欢迎进入 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)