

口腔执业医师实践技能复习大全 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/653/2021_2022__E5_8F_A3_E8_85_94_E6_89_A7_E4_c22_653210.htm

者椅位的调节、牙松动度的检查、基本操作技能、取印模、口腔检查、牙及咬合、颞下颌关节检查、开髓术、手用器械洁治、下颌神经走向、吸氧方法！

者椅位的调节： 调节好椅子靠背，使靠背上缘与患者肩胛骨上缘平齐，以便支持腰部保证患者的安全和舒适。 患者头应靠稳在治疗椅上，以防患者头部移动而被器械误伤口腔组织。 检查上颌牙时，应调节背部和头部的椅位，稍微后仰，使患者张口时，上颌牙列与地平面呈45°角，以便检查。 检查下颌牙时，要使患者头颈长轴与躯干成一线，患者张口时下颌牙列与地面平行。 避免患者张口过大，防止因面部肌肉过于紧张而妨碍口腔前庭的检查。

口镜的用途： 反射并集中光线于被检部位，增加照明。 反映被检部位的影像，并能适当扩大被检部位。 撑开显露或按压颊、唇、舌等软组织。 口镜柄叩诊。 探针的用途： 辅助发现牙体缺损； 用于检查邻面龋，牙合面浅龋； 探查龋洞、探测患区的感觉，发现敏感部位； 探测牙周袋用钝头探针。 镊子的用途： 用于夹棉球、拭净被检查部位或涂药、测定牙齿松动度及镊子柄叩诊。 临床上张口受限分度： 轻度张口受限：上下切牙切缘间距仅可置入两横指，约2~2.5左右； 中度张口受限：上下切牙切缘间距仅可置入一横指，约1~2左右； 重度张口受限：上下切牙切缘间距不到一横指，约1以内； 完全张口受限：完全不能张口，也称牙关紧闭。

牙松动度的检查： 检查前牙时

用镊子夹住切缘晃动，检查后牙时，将镊子并拢后放在牙合面裂沟中央向颊舌（腭）及近远中方向晃动。临床常用牙松动度记录方法：以mm计算松动的幅度：Ⅰ度松动：松动幅度在1mm以内；Ⅱ度松动：松动幅度在1~2mm以内；Ⅲ度松动：松动幅度在2mm以上。以牙冠松动方向计算：Ⅰ度松动：颊舌（腭）方向松动；Ⅱ度松动：颊舌（腭）方向松动，伴有近远中方向松动；Ⅲ度松动：颊舌（腭）方向松动，伴有近远中方向松动及垂直方向松动。常用消毒药物及浓度：1：1000新洁尔灭；1%碘酊消毒干燥后70%酒精脱碘；0.1%洗必泰溶液；0.5%碘伏；75%酒精；

3%双氧水。相关推荐：[#0000ff>临床执业医师实践技能考试模拟试题汇总](#) [#0000ff>2011年医师实践技能：口干的病史采集要点](#) [#0000ff>2011年医师实践技能：张口受限的鉴别诊断](#) 特别推荐：[#0000ff>2011年医师实践技能考试大纲](#) [#0000ff>考试时间](#) 欢迎进入 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com