

2011临床执业医师《专业综合二》精选习题二 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/653/2021_2022_2011_E4_B8_B4_E5_BA_8A_c22_653276.htm 临床执业医师《专业综合二》

精选习题供广大考友备考使用！一、单选题(每题的备选答案中只有一个最佳答案。)

1、诊断前列腺增生症简单易行的方法: A.超声波探查 B.残余尿测定 C.膀胱造影 D.膀胱镜检查 E.直肠指诊

标准答案：e 2、处理急性尿潴留最常用的方法是: A.针灸 B.用手掌压迫下腹部 C.导尿 D.耻骨上膀胱穿刺 E.耻骨上膀胱造瘘

标准答案：c 3、前列腺增生排尿困难出现的尿失禁现象是: A.压力性尿失禁 B.真性尿失禁 C.充盈性尿失禁 D.严重膀胱炎所致 E.高度挛缩膀胱所致

标准答案：c 4、前列腺增生时既能作膀胱残余尿测定,又能排除尿道狭窄的最好方法是: A.尿道扩张 B.经尿道插入导尿管 C.超声波探查法 D.

直肠指诊 E.膀胱区叩诊

标准答案：b 5、由前列腺增生引起的排尿困难,采用下列哪项措施是错误的? A.用女性激素 B.留置导尿 C.尿道扩张 D.前列腺切除 E.膀胱造瘘

标准答案：c 6、65岁男性,进行性排尿困难3年,曾数次发生急性尿潴留,前列腺明显增大,有弹性,残余尿150ml,血

压18.7/11.3kPa(140/85mmHg)心肺功能正常,最好的治疗方法是: A.留置导尿管 B.耻骨上膀胱造瘘 C.前列腺切除术 D.双侧

睾丸切除术 E.应用女性激素

标准答案：c 7、男,65岁,排尿困难2年余,近来明显加重,查体:前列腺明显增大,质软,尿中脓细胞满视野,血尿素氮17.9mmol/L(50mg%)残余尿150ml,心肺正

常,应先作哪种治疗? A.使用女性激素 B.留置导尿,控制感染 C.膀胱造瘘 D.前列腺切除术 E.双侧睾丸切除

标准答案：c 8、

70岁男性,进行性排尿困难4年,多次出现过急性尿潴留,目前排尿呈点滴状,前列腺明显增大,质中,残余尿300ml,患者有冠心病已数年,时有心律不齐和心绞痛发作,最好采用哪种治疗方法:
A.用女性激素 B.长期留置导尿管 C.耻骨上膀胱造瘘 D.前列腺切除术 E.双侧睾丸切除 标准答案 : c 9、 肾癌血尿特点是: A. 镜下血尿 B.终末血尿 C.全程肉眼血尿,终末加重 D.全血尿伴有血块 E.无痛性间歇性肉眼全程血尿 标准答案 : e 10、 肾盂肿瘤的主要诊断依据是: A.无痛性血尿 B.肾脏阴影增大 C.尿液脱落细胞找到肿瘤细胞 D.梗阻型肾图象 E.造影片上肾盂充盈缺损 标准答案 : e 小编推荐 : #0000ff>2011临床执业医师《专业综合二》精选习题一 #0000ff>2011年临床执业医师考试复习必做100道题 #0000ff>2011临床执业医师《专业综合一》精选习题汇总 #0000ff>2011年临床执业医师考试模拟练习题及答案汇总 100Test 下载频道开通 , 各类考试题目直接下载。 详细请访问 www.100test.com