

2010年临床医师实践技能操作真题及答案一 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/653/2021_2022_2010_E5_B9_B4_E4_B8_B4_c22_653298.htm

临床医师实践技能操作详细介绍！希望对于考生有所帮助！

1.外科操作问：你接下一台手术先脱什么为什么？然后该怎么做？手术完毕，如有接台手术，先脱手术衣，后脱手套（先脱手套，用手脱手术衣容易污染手部）。

由护士解开腰带后将手术衣自背部向前反折脱掉，小心使手套的腕口随之翻转于手上。先用右手将左手手套扯至左手掌指部，再以左手手指扯去右手手套，最后用右手指在左手掌部推下左手手套。全过程防止手部皮肤接触到手套的外面。脱下的手套如未破，则不必重新刷手，只需要手臂浸泡酒精或苯扎溴铵溶液5分钟，再穿无菌手术衣和戴手套。

如前一次手术为污染手术，不管手套是否已破，则接台手术要重新洗手。

2.胃大部分切除后形成瘻管，二次手术区消毒是由内向外还是由外向内呢？由外向内进行消毒

锁骨上窝和肩胛下区在体表的位置 锁骨上窝（supraclavicularfossa）（左、右）为锁骨上方的凹陷部，相当于两肺尖的上部。肩胛下区（infrascapularregion）（左、右）为两肩胛下角的连线与第12胸椎水平线之间的区域。后正中线将此区分为左右两部分。

3.大手术后为什么要吸氧？1、大手术多为全身麻醉，全麻术后早期患者有呼吸遗忘，呼吸肌功能未完全恢复，吸氧有助于提高血氧。

2、开胸及开腹手术后呼吸功能受限，必须吸氧。3、大手术容易造成机体的应激反应，患者肺功能受影响较大，应当吸氧

4.油污，胶布的去方法？两次碘酊消毒间为什么要等待？等待时间是多少？肥皂水，松节油清

除。两次碘酊消毒间隔原因是为了充分灭菌，以及等待第一次消毒略风干后，再进行第二次消毒。一般等待1分钟。

5.颈椎前屈后伸的角度是多少？谢谢 前屈后伸颈椎35-4535-45

6.胃手术的消毒范围（问这个手术是否要备皮）？胃切除术手术消毒区范围:上界为两侧腋窝皱褶处连线，也有为两乳头连线.下界至下肢股骨上1/3处（相当于会阴部水平线）。两侧界为腋前线。（上至胸乳头连线，下至腹股沟、耻骨联合，两侧至腋前线之间范围。）需要备皮。

7.颈动脉按住不能超过几秒？手离开时间不超过几秒？不能双侧同时按压。单侧按压不超10秒，放开不超1秒。

8.为什么先清创后缝合？先清创后缝合是以免造成感染。

9.湿化瓶的作用？医药用氧是纯氧，但也是干氧没有水份，不向自然界空气中含有水份存在，干燥的氧气会刺激人的上呼吸道造成不舒适的感觉。所以在吸氧时要先给氧增湿。当然也可以从增湿瓶观察出氧量的大小,便于调整。

10.问扁桃体肿大如何划分? 临**把扁桃体肿大分为三度：I度：扁桃体肿大不超过咽腭弓 II度：超过咽腭弓 III度：肿大达或超过咽后壁中线。

11.骨折外固定目的？活动性出血要如何处理？固定可以保持整复后的位置不变，促进骨折愈合。急救时外固定能避免二次损伤，并能避免骨折端活动，减轻病人痛苦。最有效的紧急止血法是加压于出血处，压住出血伤口或肢体近端的主要血管，然后在伤口处用敷料加压包扎，并将伤部抬高，以控制出血。慎用止血带，但对出血不止的四肢大血管破裂，则可用橡皮止血带或充气止血带，须衬以不料。记录上带时间，每1 - 2小时松解1次，每次5 - 10分钟。解开止血带时不可突然松开，同时应压住出血伤口以防大出血造成休克。相关推荐：#0000ff>临床执业医师

实践技能考试模拟试题汇总 #0000ff>公卫医师资格考试流行病学练习题汇总 #0000ff>临床医师实践技能考试机构要求及器材配备 特别推荐： #0000ff>2011年医师实践技能考试大纲 #0000ff>考试时间 欢迎进入 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com