

2011年公卫执业医师：风疹减毒活疫苗简介 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/653/2021_2022_2011_E5_B9_B4_E5_85_AC_c22_653315.htm

风疹减毒活疫苗的使用方法及风疹减毒活疫苗接种反应及禁忌症！风疹减毒活疫苗的使用方法（1）该疫苗为冻干制品，对1人份/支或和2人份/支的冻干疫苗，分别加入0.5ml、1.0ml灭菌注射用水，待完全溶解后立即使用。（2）上臂外侧三角肌附着处皮肤用75%乙醇消毒，等干后皮下注射0.5ml。（3）如必须同时接种另一种疫苗，风疹疫苗可与麻疹疫苗、脊髓灰质炎疫苗、百白破混合疫苗、卡介苗等在不同部位同时接种。对接受输血或注射过免疫球蛋白者，应推迟6周以上再接种风疹疫苗。风疹减毒活疫苗接种反应及禁忌症（1）接种反应 冻干风疹活疫苗接种后反应极少。小儿接种后6~11天少数人有低热、皮疹、淋巴结炎。皮疹多为不明显的斑疹，可迅速消退。淋巴结炎症状轻，很少见。成人接种疫苗后2-4周，少数人可发生暂时性关节炎症状，尤其是接种前即患有此类疾病者。青春期后女性关节反应随年龄增加而明显增加，持续1天至3周，可对症处理，无后遗症。尚有极少数的人出现皮疹和淋巴结肿大，此症状为一过性的，能自行消失，无需治疗。（2）禁忌 孕妇禁用。育龄期妇女在接种疫苗后3个月内应避孕。患严重疾病、发热或有过敏史者不得接种。神经系统疾患和精神病（癫痫、癌症、脑炎后遗症、抽搐等疾患）或有既往史者，免疫缺陷症及正进行免疫抑制治疗、放射治疗及抗代谢药物治疗期间，不能接种风疹疫苗。 相关推荐：#0000ff>2011年公卫执业医师：合理膳食的概念 #0000ff>2011年公卫执业医师：营养

失调的表现 #0000ff>公卫执业医师考试模拟试题及答案(卫生统计学)汇总 特别推荐： #ff0000>2011年公卫执业医师考试大纲 #0000ff>考试时间 欢迎进入 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com