

2010年医师实践技能操必考题（考官手持本）PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/653/2021_2022_2010_E5_B9_B4_E5_8C_BB_c22_653510.htm

医师实践技能操必考题（考官手持本）供广大考友备考使用！一、体格检查（1）共50题 1

号题：患者男性36岁，因头胀痛10天，加重2天来院门诊。2个月前患“鼻窦炎”，有高血压病家族史。（18分）考试与评分标准：

（1）考官问：患者测过体温，在眼、鼻、耳及神经系统检查均无阳性体征发现后，你觉得还应做什么检查？

（2分）考生答：测血压。（2）考官问：动脉血压测量方法有几种？

（2分）考生答：直接测压法（1分）和间接测压法（1分）。（3）考官指定考生：用间接测量法测量被检查者

血压。（12分）A、查体前，爱伤意识。（1分）态度、语言

（告知）、动作 B、考生操作：测血压（7分）I查血压计，

安置被检者肘部位置正确（1分）；先检查水银柱是否在“0

”点。被检者肘部置于心脏同一水平。I血压计气袖绑扎部位正确、松紧度适宜（1分）；气袖均匀紧贴皮肤，缠于上臂

（充气皮管向下、向上均可），其下缘在肘窝以上约2~3cm

。I听诊器胸件（或称体件）放置部位正确（2分）；胸件置

于肱动脉搏动处（不能塞在气袖下，若有考生将听诊器胸件

置于气袖下，扣1分）。I测量过程流畅（3分）；向气袖内充

气，边充气边听诊至肱动脉搏动声消失，水银柱再升高20

~30mmHg后，缓慢放气并双眼平视观察汞柱，根据听诊和

汞柱位置读出收缩压、舒张压。C、查体结束爱伤意识。（1

分）态度、语言（告知）、动作 D、考官复测血压，读数基

本正确。（3分）考生向考官报告刚才测得实际血压读数（

先报收缩压再报舒张压)，考官复测一次，验证考生测定血压读数是否正确，（如读数与考官测得读数差异很明显，收缩压差异大于10mmHg，舒张压差异大于5mmHg则不能得分）（4）提问：何谓高血压？（2分）考生答：年龄在18岁以上成人（0.5分），采用标准测量方法，至少3次非同日（0.5分）血压达到或超过140/90mmHg（0.5分），或仅舒张压达到或超过90mmHg（0.5分），即可认为高血压，仅收缩压达到或超过140mmHg称收缩期高血压。2号题：患者男性27岁，前额头痛及眼胀痛，流少量黄色脓涕1周。起病后不发热，无咳嗽。家族史：其父亲因高血压病，脑溢血2年前病故。（18分）考试与评分标准：（1）考官问：你作为接诊医师，在为病人测过体温，眼、鼻、耳检查以及神经系统检查均无阳性体征发现，你觉得还应做什么检查？（2分）考生答：测血压。（2）考官问：动脉血压测量方法有几种？（2分）考生答：直接测压法（1分）和间接测压法（1分）。（3）考官指定考生：用间接测量法测量被检查者血压。（12分）A、查体前，爱伤意识。（1分）态度、语言（告知）、动作B、考生操作：测血压（7分）I检查血压计，安置被检者肘部位置正确（1分）；先检查水银柱是否在“0”点。被检者肘部置于心脏同一水平。I血压计气袖绑扎部位正确、松紧度适宜（1分）；气袖均匀紧贴皮肤，缠于上臂（充气皮管向下、向上均可），其下缘在肘窝以上约2~3cm。I听诊器胸件（或称体件）放置部位正确（2分）；胸件置于肱动脉搏动处（不能塞在气袖下，若有考生将听诊器胸件置于气袖下，扣1分）。I测量过程流畅（3分）；向气袖内充气，边充气边听诊至肱动脉搏动声消失，水银柱再升高20~30mmHg后，缓慢

放气并双眼平视观察汞柱，根据听诊和汞柱位置读出收缩压、舒张压。C、查体结束爱伤意识。（1分）态度、语言（告知）、动作D、考官复测血压，读数基本正确。（3分）考生向考官报告刚才测得实际血压读数（先报收缩压，后报舒张压），考官复测一次，验证考生测定血压读数是否正确（如读数与考官读数差异很明显，收缩压差异大于10mmHg，舒张压差异大于5mmHg则不能得分）（4）提问：有一病人，多次测得两上肢血压（收缩压）差超过10mmHg？问多见于何种疾病？（举两个疾病）（2分）考生答：多见于多发性大动脉炎（1分）或先天性的动脉畸形（1分）。3号题：患者男性，18岁，诉昨晚在看完电视后觉得眼睛痛，且有“复视”现象，要求做进一步检查。（18分）考试与评分标准：（1）、考官问：你作为接诊医师，在眼检查方面应检查那些内容？（3分）考生答：视力检查（0.5分）；瞳孔检查：瞳孔大小（0.5分），集合反射（0.5分）；瞳孔对光反射（直接与间接）（1分），眼球运动等各项检查（0.5分）。（2）、考官指定考生为被检者做眼球运动，间接、直接对光反射检查（12分）A、查体前，爱伤意识。（1分）态度、语言（告知）、动作B、眼球运动检查方法正确（5分）；检查者执目标物（如棉签或笔尖或示指尖），于受检查者眼前30~40cm（1分），告知被检查者头不要转动，眼球随目标物方向移动（1分），一般按被检者左、左上、左下，右、右上、右下6个方向的顺序进行（每个方向0.5分）。C、对光反射（间接、直接）检查方法正确（5分）；I直接对光反射检查：将光源直接照射被检查者瞳孔，观察瞳孔变化（1分），双眼瞳孔都检查（1分）。II间接对光反射：指光线照射一眼时，另一眼瞳

孔立即缩小，移开光线，瞳孔恢复原来大小（1分）。双眼瞳孔都检查（1分）。I间接对光反射检查时，应以一手挡住光线以免光线照射到要检查之眼而形成直接对光反射（1分）。

D、检查结束后应说的话。（1分）态度、语言（告知）、动作（3）、提问：（3分）眼球运动检查的意义是什么？双眼瞳孔对光反射迟钝或消失，多见于何种病人？考生答：眼球运动是检查6条眼外肌的运动功能，若有某一方向运动受限，提示该对配偶肌功能障碍和支配该对配偶肌眼神经麻痹（1.5分），双眼瞳孔对光反射迟钝或消失，见于昏迷病人（1.5分）。

4号题：患者女性，14岁，自幼体健，视力好，近来觉得看不清黑板上的字，且他人发现患者眼睛有“斜视”的想象，即来院检查。（18分）考试与评分标准：（1）、考官问：你作为接诊医师，在眼功能、瞳孔和眼球方面应检查那些内容？（3分）考生答：要做视力检查（0.5分），瞳孔大小（0.5分），集合反射检查（0.5分），瞳孔对光反射（直接与间接）（1分），眼球运动等各项检查（0.5分）。（2）、指定考生为被检者者做集合反射，直接、间接对光反射检查（12分）

A、查体前，爱伤意识。（1分）态度、语言（告知）、动作

B、集合反射检查方法正确（5分）；嘱被检查者注视1m外目标（1分）（通常是检查者的示指尖，置于双眼等距离），然后将目标物逐渐（1分）移近眼球（距离眼球越5-10cm）（1分），观察被检查者两眼球是否内聚、瞳孔缩小（2分）。（注：若考生不主动讲观察“两眼球是否内聚，瞳孔缩小”内容时，考官可插问，观察什么？）

C、对光反射（间接、直接）检查方法正确（5分）；I直接对光反射检查：将光源直接照射被检查者瞳孔，观察瞳孔变化（1分），检查双眼瞳孔

(1分)。I间接对光反射：指光线照射一眼时，另一眼瞳孔立即缩小，移开光线，瞳孔恢复原来大小(1分)。注意检查双眼瞳孔(1分)。II间接对光反射检查时，应以一手挡住光线以免光线照射到要检查之眼而形成直接对光反射(1分)。

D、检查结束后应说的话。(1分)态度、语言(告知)、动作(3)、提问：(3分)。双眼瞳孔缩小(针尖瞳)，提示什么问题？答：提示：A、中毒(有机磷农药等)(1分)；B、虹膜炎(1分)；C、药物反映(吗啡、冬眠灵，毛果芸香碱等)(1分)。答案也可以是包括幅奏反射和调节反射。

幅奏反射：告知被检者头部不动，双眼注视1m外的检查者的示指(0.5分)，然后将示指缓慢移近距离眼球越5-10cm(1分)，正常反应是双眼内聚(1分)。

调节反射：告知被检者头部不动，双眼注视1m外的检查者的示指(0.5分)，然后将示指快速移近距离眼球越5-10cm(1分)，正常反应是瞳孔缩小(1分)。

5号题：患者女性，46岁，已婚，反复发热2月余，经多家医院诊治，未查明原因，近2天，患者颈部及左腹股沟处摸到“肿块”来院就诊。(18分)考试与评分标准：(1)、考官问：你作为接诊医师，测过体温后，行浅表淋巴结触诊时应主要检查哪些部位的淋巴结群？(3分)考生答：表浅淋巴结主要部位有头颈部淋巴结群(1分)、上肢淋巴结群(1分)和下肢淋巴结群(1分)。(2)、考官指定考生做颈部淋巴结检查、腋窝淋巴结检查。(在被检查者人体上操作演示)(12分)A、查体前，爱伤意识。(1分)态度、语言(告知)、动作B、颈部淋巴结检查方法正确(5分)I医师位置(1分)。一般应站在被检查者后面，边检查边告知被检者正确体位、姿势。I检查手法正确(2分)

）检查者先将自己的双手揉擦暖和（1分），然后将手指紧贴检查部位，由浅及深进行滑动触诊（1分）。I检查顺序正确（2分）一般顺序：耳前、耳后、乳突区、枕骨下区、颌下、颏下、颈前三角、颈后三角、锁骨上。（如顺序不对，无规律的触摸，不能得分）。C、腋窝淋巴结检查方法正确（5分）I告知被检者的体位和姿势正确（1分）。请被检者坐下，考生面对被检查者。I检查手法正确（4分）检查者左手握住被检查者左手腕，将其前臂外展，再以右手触诊被检查者左侧腋窝的5组淋巴结（2分），另一侧腋窝则相反，检查者以右手握着被检查者右手腕，将其前臂外展，以左手检查右侧腋窝触摸5组淋巴结（2分）检查腋窝两侧由浅及深至腋窝顶部。I(腋窝淋巴结检查顺序:尖群,中央群,胸肌群,肩胛下群和外侧群) D、查体结束爱伤意识。（1分）态度、语言（告知）、动作（3）、提问：肺癌、胃癌及乳腺癌最易转移至何处浅表淋巴结？（3分）答：肺癌常见向锁骨上或腋窝淋巴结群转移，尤以向右锁骨上转移多见（1分）。胃癌多见于向左锁骨上淋巴结转移（1分），乳腺癌多见于转移至腋窝淋巴结（1分）。编辑推荐：#0000ff> 2011年医师实践技能考试考前冲刺专题 相关推荐：#0000ff>2011年医师实践技能考试准考证领取时间汇总 特别推荐：#0000ff>2011年医师实践技能考试大纲 #0000ff>考试时间 欢迎进入 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com