

临床外科考点：硬膜外隙阻滞 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/653/2021_2022__E4_B8_B4_E5_BA_8A_E5_A4_96_E7_c22_653571.htm 将局麻药注入硬膜外隙，产生某一节段神经阻滞，应用范围较广！将局麻药注入硬膜外隙，产生某一节段神经阻滞，应用范围较广。1.适应症 常用于下腹部、腰部及下肢手术，且不受手术时间的限制。也可用于颈部、上肢和胸壁的手术。胸、腹、下肢手术术后镇痛。2.并发症 2.1术中并发症（1）全脊髓麻醉：是硬膜外麻醉最严重的并发症。由于硬膜外阻滞所用的麻醉药全部或大部分注入蛛网膜下腔所致。一旦发生，病人数分钟内呼吸停止，血压下降。应立即行人工呼吸，维持循环。（2）局麻药毒性反应 硬膜外隙有丰富的静脉丛，硬膜外导管可误入血管内，或损伤血管，注入局麻药后，血内局麻药浓度过高，导致毒性反应。（3）血压下降（4）呼吸抑制（5）恶心、呕吐 2.2术后并发症 神经损伤 硬膜外血肿 硬膜外脓肿 脊髓前动脉综合征：脊髓前动脉是终末动脉，如较长时间血供不足，可引起脊髓缺血甚至坏死，称脊髓前动脉综合征。可能原因：原有动脉硬化，血管腔狭窄，见于老年人；局麻药中肾上腺素浓度过高，引起脊髓前动脉持久收缩；麻醉期间较长时间低血压。 小编推荐：#0000ff>2011年临床外科考点：耳源性脑积水 #0000ff>临床助理外科考点：肝损伤检查方法 #0000ff>临床助理外科考点：脑干损伤的检查 特别推荐：#ff0000>2011年临床助理医师考试大纲 #0000ff>考试时间 欢迎进入 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com