

2011年中医助理外科考点：阳痈证治则例 PDF转换可能丢失
图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/653/2021_2022_2011_E5_B9_B4_E4_B8_AD_c22_653616.htm 凡患色红疼痛，根盘寸余者痛也。毒发三、四日，尚未成脓，以抑阳散（通用五十七。）围患外，内以醒消丸（通用四十七。）热陈酒送服三钱，其痛即止，夜间得睡，次日患皮起皱，再一服全消。如过四、五日，患将作脓，亦以醒消丸与服，消其四围肿硬，痛息毒散，此以大变小之法。有脓之患，顶取咬头膏（通用六十一。）贴，加以代刀散（通用三十九。）三钱，酒服穿之，或以针刺分许穿之，以洞天膏（通用七十六。）贴，不几日收功。如患盘数寸者，或居背心、脑后、腰肚、胸、腋、阴囊等险穴处，则用五通丸（通用五十。）三钱，醒消丸三钱，早晚以败毒汤（通用二。）轮服，皮皱痛止，再服至愈。倘溃，即用内托散（通用三十八。）醒消丸，亦早晚轮服。初起兼发热恶寒，肢体拘急者，散消饮（通用十一。）主之。待表证退，再按前法治之。溃后忽见恶寒发热等表证者，托邪饮（通用十二。）主之，待表退，按前治法。大便干燥秘涩，虽数日不解，宜润之，不可下也，润肠煎（通用十三。）主之。如有表证，只宜解表，表解而里自通，设仍不通，投以润肠煎。大痈不论已溃未溃，但发热而不恶寒者，此热胜血也，败毒汤加四物汤（通用二十三。）主之。妊妇患痈，不可与醒消丸，以丸内有麝香故也，宜以仙方活命饮（通用一。）去山甲愈之。如即溃余毒未尽，肿硬不消，治以内托散，去川芎加乳香、没药。醒消丸内麝香价贵，如有家贫不能服者，以仙方活命饮代之，然不及醒消丸速效。 相关推

荐：#0000ff>2011年中医外科考点：提脓祛腐药的应用
#0000ff>2011年中医助理医师：证候诊断的要点 #0000ff>2011
年中医助理医师：证候诊断的综合运用 特别推荐：
#0000ff>2011年中医助理医师考试大纲 #0000ff>考试时间 欢迎
进入 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请
访问 www.100test.com