

公卫助理医师：性病的症状 PDF转换可能丢失图片或格式，
建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/653/2021_2022__E5_85_AC_E5_8D_AB_E5_8A_A9_E7_c22_653685.htm 在此潜伏期后，如果出现一些令人不适的症状，如：生殖器溃疡是一期梅毒的典型表象：溃疡直径一般一厘米左右，男性多发生在阴茎冠状沟的部位，女性多发生在大阴唇、小阴唇或子宫颈。由于溃疡表面没有明显的脓液，患者本人也不觉得痛，常常被忽视，直到出现二期梅毒的皮疹时才到医院看病。外阴部的出现疣状物可能染上了尖锐湿疣：染上尖锐湿疣的病人一般没有什么不舒服的感觉，既不会造成小便疼痛、不适，也不会在外阴部出现溃疡。它悄悄发生、逐渐增大，直到有一天病人有意或无意中注意到在外阴部出现了小疣状物。尖锐湿疣男性多见于冠状沟、阴茎、包皮内侧，女性多见于大阴唇及小阴唇，但也可发生在泌尿生殖器的其他部位，如尿道口、宫颈等不易察觉到之处。外阴部出现的小水疱可能染上生殖器疱疹：它的特点是在外阴部出现一小堆约4~5个小水疱，局部有一种烧灼感或刺痛，10天左右糜烂面也能长上，但极易复发，给患者的心理上带来巨大的压力。尿道口出现脓性分泌物要怀疑可能感染上淋病。相关推荐：#0000ff>我国自主研发的艾滋病唾液检测试剂面世 #0000ff>2011年传染病知识肺结核详解 #0000ff>2011年公卫助理医师：流行性乙型脑炎特别推荐：#0000ff>2011年公卫助理医师考试时间 #0000ff>考试大纲 欢迎进入 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com