

临床诊断：肩关节结核的诊断依据 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/654/2021\\_2022\\_\\_E4\\_B8\\_B4\\_E5\\_BA\\_8A\\_E8\\_AF\\_8A\\_E6\\_c22\\_654068.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/654/2021_2022__E4_B8_B4_E5_BA_8A_E8_AF_8A_E6_c22_654068.htm) 肩关节结核的诊断

依据：有结核病史、出现低烧、食欲减退、寒性脓肿等症状

。（1）有结核病史或与结核病患者接触史。（2）可有低烧、盗汗、食欲减退、消瘦等中毒症状。（3）肩关节疼痛、压痛、肿胀、活动度受限，三角肌显示萎缩。（4）可出现寒性脓肿，溃破形成窦道。（5）结核活动期血沉增快。（6）X线摄片可显示肱骨头或肩关节有骨质破坏。 小编推荐

：#0000ff>2011年诊断学考点：结节性脂膜炎的病理诊

断#0000ff>2011年诊断学考点：肺界叩诊#0000ff>临床诊断：

二尖瓣关闭不全的鉴别诊断 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)