

2011年中医妇科：外阴血肿 PDF转换可能丢失图片或格式，
建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/654/2021_2022_2011_E5_B9_B4_E4_B8_AD_c22_654381.htm 外阴血肿是由机械损伤、跌仆撞击或外阴手术操作不慎，瘀血滞留所致。【概述】由机械损伤、跌仆撞击或外阴手术操作不慎，瘀血滞留所致。【病因病理】外阴络脉破损，瘀血溢出，滞留肌肤所致。【诊断要点】根据病史和外阴局部有肿胀，皮色紫黯，疼痛拒按，即可诊断本病。【辨证分型】本病是瘀血内阻所致。因跌仆撞击，或外阴手术和机械损伤导致外阴局部肿胀，皮色紫黯，疼痛拒按。瘀久化热可致外阴感染，局部掀红肿痛，继而化脓。苔薄，舌质黯，脉弦。【分型治疗】瘀血内阻治法：活血化瘀，消肿止血。方药：血府逐瘀汤加减。当归10克生地12克桃仁10克红花6克赤芍12克枳壳10克柴胡10克川牛膝10克生甘草3克蒲黄12克（包）蒲公英15克加减：瘀久化热，局部红肿痛者，加金银花12克、连翘12克、红藤30克、生大黄6克、黄柏10克；疼痛剧烈者，加乳没药各6克、延胡索15克。【中成药】1.八号止血粉每日3次，每次1／3包。吞服。2.伤科七味片每日3次，每次2片，吞服。3.伤痛宁片每日2次，每次5片，吞服。4.云南白药每日3次，每次3克，吞服。【简便方】1.三色敷药，局部外敷。2.金黄膏，局部外敷。3.大黄30克、玄明粉120克，研末外敷患处。4.蒲公英30克、乳没药各15克、黄连10克，湿敷患处。【注意事项】1.发现外阴局部血肿，应减少活动和避免挤压。2.急性期血肿逐步增大时不可热敷，应使用冷敷。3.如果血肿继续扩大或化脓，可切开引流。4.忌食辛辣刺激食物。 小编推荐：#0000ff>2011

年中医妇科：血虚型妊娠腹痛的辨证论治 #0000ff>2011年中医
妇科考点：血崩证的治疗 #0000ff>2011年中医妇科高频考点：
鬼胎的辨证论治 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下
载。详细请访问 www.100test.com