

2011年中医助理：影响中药剂量因素 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/654/2021_2022_2011_E5_B9_B4_E4_B8_AD_c22_654426.htm

中药用量得当与否，是直接影
响药效的重要因素之一。中药用量得当与否，是直接影
响药效的重要因素之一。确定中药的剂量，应考虑以下几方面的
因素。（1）药物性质与剂量的关系 剧毒药或作用峻烈的药
物应严格控制剂量，开始时用量宜轻，逐渐加量，一旦病情
好转后，应当立即减量或停药，中病即止，防止过量或蓄积
中毒。（2）剂型、配伍与剂量的关系 在一般情况下，同样
的药物入汤剂比入丸散剂的用量要大些；单味药使用比复方
中应用剂量要大些；在复方配伍使用时，主要药物比辅助药
物用量要大些。（3）年龄、体质、病情与剂量的关系 一般
老年、小儿、妇女产后及体质虚弱的病人，都要减少用量，
成人及平素体质壮实的患者用量宜重。病情轻、病势缓、病
程长者用量宜小；病情重、病势急、病程短者用量宜大。

（4）季节变化与剂量的关系 夏季发汗解表药不宜多用；冬
季发汗解表药可以多用；夏季苦寒降火药用量宜重；冬季苦
寒降火药用量宜轻。除了剧毒药、峻烈药、精制药及某些贵
重药外，一般中药常用内服剂量为5~10g；部分常用量较大，
剂量为15~30g；新鲜药物常用量为30~60g。 小编推荐：

#0000ff>2011年中医基础：中医病机学 #0000ff>2011年中医基

础考点：内生五邪 #0000ff>2011年中医基础考点：五脏与五液

的关系 特别推荐： #0000ff>2011年中医助理医师考试大纲

#0000ff>考试时间 欢迎进入 100Test 下载频道开通，各类考试

题目直接下载。详细请访问 www.100test.com