

2011年口腔助理医师：恒牙早萌 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/654/2021_2022_2011_E5_B9_B4_E5_8F_A3_c22_654440.htm

恒牙早萌多见于前磨牙，下颌多于上颌。恒牙早萌多见于前磨牙，下颌多于上颌。【病因】主要与先行的乳磨牙根尖周病变或过早脱落有关，因乳磨牙根尖周病变将后继恒牙胚周围的牙槽骨破坏，使恒牙过早暴露于口腔中。【临床表现】早萌恒牙因牙根发育不足，以及有的恒牙牙胚周围有感染的乳牙残根存在，炎症的肉芽组织把恒牙胚推出牙槽骨外，使早萌的恒牙极度松动，早萌恒牙常伴有釉质矿化不起或釉质发育不全现象。【治疗】控制乳磨牙根尖周围炎症是防止恒牙早萌的重要治疗环节。对早萌牙是甬进行阻萌，需根据早萌牙的松动情况，以及对才存在与否而定，如早萌牙松动不明显，则可不阻萌，若对乳牙缺失，为防止早萌牙过长，可做阻萌器。实践证明，控制乳牙根尖周围炎症感染比阻萌更重要。因此，拔除乳牙残根、残冠、治疗有根尖病变的邻牙，是保证早萌牙继续发育的重要环节。其次，应对早萌牙进行局部涂氟，预防龋病的发生。

相关推荐：[#0000ff>2011年口腔助理A1型全真模拟试题汇总](#) [#0000ff>2011年口腔助理医师：颌面部坏死性筋膜炎](#) [#0000ff>2011年口腔助理医师：颌骨骨密度的检查法](#) 特别推荐：[#0000ff>2011年口腔助理医师考试时间](#) [#0000ff>考试大纲](#) 欢迎进入 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com