2011年口腔助理医师:龋坏深度 PDF转换可能丢失图片或格式,建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/654/2021_2022_2011_E5_B9_ B4 E5 8F A3 c22 654514.htm 龋坏深度分三种:浅龋、中龋 和深龋。 龋病易发生于牙体不易自洁的滞留区,特别是磨牙 合面的沟隙或牙列的拥挤嵌塞食物处。其龋坏深度分三种。 1) 浅龋:病变仅局限于牙釉质或牙骨质,局部可见白色或灰 黑色的龋斑。无自觉症状,探查时可卡住探针尖端,探针滑 过病变部位有粗糙感,探之无痛苦。2)中龋:病变较深, 累及牙本质浅层,局部变黑,可有温度或化学性激发痛,探 之有明显龋洞且敏感。3)深龋:病变深及牙本质深层而接 近牙髓腔,遇食物嵌塞或冷热酸甜等刺激均产生疼痛,局部 多见黑洞。探针可探查洞底在牙本质深层,探之极敏感或疼 痛,无自发痛史。相关推荐:#0000ff>2011年口腔助理医师 : 灼口综合症 #0000ff>2011年口腔助理医师: 药物性牙龈增生 #0000ff>2011年口腔助理医师:乳牙尖周炎的治疗方法特别推 荐: #0000ff>2011年口腔助理医师考试时间 #0000ff>考试大纲 欢迎进入 100Test 下载频道开通, 各类考试题目直接下载。详 细请访问 www.100test.com