

2011年公卫医师：预防接种的护理 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/654/2021\\_2022\\_2011\\_E5\\_B9\\_B4\\_E5\\_85\\_AC\\_c22\\_654516.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/654/2021_2022_2011_E5_B9_B4_E5_85_AC_c22_654516.htm)

预防接种对人是一种外来的刺激，活菌苗、活疫苗的接种实际上是一种轻度感染，死菌苗、死疫苗对人体是一种异物刺激。预防接种对人是一种外来的刺激，活菌苗、活疫苗的接种实际上是一种轻度感染，死菌苗、死疫苗对人体是一种异物刺激。因此，在接种后会有不同程度的全身或局部反应。

1.常见反应

全身反应：接种后5-6小时或24小时出现体温升高，如为活疫苗则有一定的潜伏期后才出现体温升高。有些儿童可能出现头晕、全身不适、疲倦、恶心、呕吐、腹痛、腹泻等反应。一般此类反应如较轻微时可以不作处理，注意休息，多饮水，或给予对症处理。如高热不退或症状较重时，应去医院就诊。

局部反应：接种后数小时至24小时注射局部出现红、肿、热、痛等反应，有时会伴有局部淋巴结肿大，局部反应一般持续2~3天。活疫苗接种后局部反应出现较晚，持续的时间也较长。局部反应时，可以用干净毛巾热敷，并抬高患肢。

2.异常反应

极少数病人在接种后可出现严重反应，包括

过敏性休克：在注射后数分钟至2小时后出现面色苍白、烦躁不安、呼吸困难、脉搏细弱、出冷汗、四肢冰凉、恶心呕吐、大小便失禁、甚至昏迷等过敏性休克的表现，如不及时抢救，会出现生命危险。需让患儿平卧，头部放低，立即皮下注射1：1 000的肾上腺素0.5-1ml，保暖，吸氧，并采用其它抗过敏性休克的措施。

晕针：儿童由于恐惧、精神紧张、疲劳、空腹等原因可在注射时或注射后数分钟发生头晕、心慌、面色苍白、出

冷汗、手足冰凉、心跳加快等晕针的表现。应立即使患儿平卧，饮少量的热水，并注意鉴别是否为过敏性休克。相关推荐：[#0000ff>2011年公卫执业医师：环境的区域性](#)  
[#0000ff>2011年公卫执业医师：生物浓缩](#) [#0000ff>公卫执业医师考试模拟试题及答案\(卫生统计学\)汇总](#) 特别推荐：  
[#ff0000>2011年公卫执业医师考试大纲](#) [#0000ff>考试时间](#) 欢迎进入 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)