

公卫基础理论：过度降压损坏思维 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/654/2021_2022__E5_85_AC_E5_8D_AB_E5_9F_BA_E7_c22_654540.htm

以色列研究者报告称，过度降低血压有可能对老年人的思维能力构成损害。以色列研究者报告称，过度降低血压有可能对老年人的思维能力构成损害。研究者发现，在70岁以上的老年人中，有轻度高血压者与血压较低者相较，其思路更为清晰。另一名专家则表示，这项发现意味着医生在给老年人开降血压药时需谨慎，且应为老年人调整治疗处方。韦伯（Michael Weber）博士说：“这项研究显示，血压降低过度的人，其思维能力及创造力可能受损。”“这的确令我们陷入了两难的处境。我们都知道，大幅降低血压能够帮助高血压患者减少中风、心脏病以及其它重症的风险。”韦伯也在美国纽约州立大学（State University of New York）担任内科教授。高血压在许多国家都相当普遍，且会提高心脏病、中风、心力衰竭等致命疾病的风险。美国国家高血压教育协调委员会（National High Blood Pressure Education Program Coordinating Committee）曾建议医师应尽早对高血压患者进行强化治疗，以遏制病情。而韦伯称，以色列的研究显示，这对老年高血压患者来说并不是最佳的治疗方法。韦伯说：“为不同的患者制定个别的治疗方案非常重要。医师应该意识到老年人血压降低过快可能会出现什么问题。”

相关推荐：[#0000ff>2011年公卫助理医师：脊髓灰质炎的治疗](#) [#0000ff>2011年公卫助理医师：自发性气胸](#) [#0000ff>2011年公卫助理医师：流行病学研究方法](#) [特别推荐：#0000ff>2011年公卫助理医师考试时间](#) [#0000ff>考试](#)

大纲 欢迎进入 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。
详细请访问 www.100test.com