

2011年诊断基础：精神分裂症的诊断标准 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/654/2021\\_2022\\_2011\\_E5\\_B9\\_B4\\_E8\\_AF\\_8A\\_c22\\_654603.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/654/2021_2022_2011_E5_B9_B4_E8_AF_8A_c22_654603.htm)

精神分裂症的诊断标准：思维松弛、思维破裂、言语不连贯、紧张综合征、怪异行为，或愚蠢行为等。

一、诊断标准

1.症状标准 至少有下列2项，并非继发于意识障碍、智能障碍、情感高涨或低落。单纯型精神障碍另规定。

- 1) 反复出现的语言性幻听。
- 2) 明显的思维松弛、思维破裂、言语不连贯，或思维贫乏或思维内容贫乏。
- 3) 思想被插入、被撤走、被播散、思维中断或强制性思维。
- 4) 被动、被控制或被洞悉体验。
- 5) 原发性妄想（包括妄想感、妄想心境）或其他荒谬的妄想。
- 6) 思维逻辑倒错、病理性象征思维或语词新作。
- 7) 情感倒错，或明显的情感淡漠。
- 8) 紧张综合征、怪异行为，或愚蠢行为。
- 9) 明显的意志减退或缺乏。

2.严重标准 自知力障碍，并有社会功能严重受损或无法进行有效交谈。

3.病程标准

- 1) 符合症状标准和严重标准至少持续1个月，单纯型（青少年期的发病）另有规定。
- 2) 若同时符合精神分裂症和心境障碍的症状标准，当情感症状减轻到不能满足心境障碍症状标准时，分裂症状需继续满足精神分裂症的症状标准至少2周以上，方可诊断为精神分裂症。

4.排除标准 排除器质性精神障碍及精神活性物质和非成瘾物质所致精神障碍。尚未缓解的精神分裂症患者，若又罹患本项中前述两类疾病，应并列诊断。

小编推荐：  
#0000ff>诊断基础考点：动脉瘤诊断 #0000ff>2011年临床医师：糖尿病的诊断 #0000ff>2011年临床诊断高频考点：水肿的临床表现 特别推荐： #ff0000>2011年临床执业医师考试大纲

#0000ff>考试时间 欢迎进入 100Test 下载频道开通，各类考试  
题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)