

2011年诊断基础：抑郁症的诊断标准 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/654/2021_2022_2011_E5_B9_B4_E8_AF_8A_c22_654604.htm

抑郁症的诊断标准：以情绪低落为基本症状、精力明显减退、精神运动型迟滞或激越、食欲不振等。

一、诊断标准

- 1.以情绪低落为基本症状
- 2.应有下列症状中的至少4项
 - 1) 对日常生活的兴趣下降或缺乏。
 - 2) 精力明显减退，无明显原因的持续的疲乏感。
 - 3) 精神运动型迟滞或激越。
 - 4) 自我评价过低，或自责、或有内疚感，甚至出现罪恶妄想。
 - 5) 思维困难，或自觉思考能力显著下降。
 - 6) 反复出现死亡的念头，或有自杀行为。
 - 7) 失眠，或早醒，或睡眠过多。
 - 8) 食欲不振，或体重明显减轻。
 - 9) 性欲明显减退。
- 3.严重程度标准（至少有以下情况之一）
 - 1) 社会功能受损。
 - 2) 给本人造成痛苦或不良后果。
- 4.病程标准
症状至少持续2周
- 5.排除标准
 - 1) 应排除由脑器质性疾病、躯体疾病和精神活性物质所导致的抑郁。
 - 2) 抑郁症患者可出现幻觉、妄想等症状，但应注意与精神分裂症相鉴别。

小编推荐：#0000ff>2011年诊断基础考点：留取检验标本

#0000ff>2011年诊断基础考点：判断动脉栓塞 #0000ff>2011年

诊断学考点：结节性脂膜炎的病理诊断 特别推荐：

#fff000>2011年临床执业医师考试大纲 #0000ff>考试时间 欢迎

进入 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请

访问 www.100test.com