

2011年口腔助理医师：乳牙龋蚀程度分类 PDF转换可能丢失
图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/654/2021_2022_2011_E5_B9_B4_E5_8F_A3_c22_654732.htm 乳牙龋蚀程度分为 度龋、

度龋、 度龋、 度龋。按乳牙龋蚀程度分为4度。 度龋：
为表面浅龋，可呈白浊样或褐色斑，轻度实质缺损或涉及
牙本质浅表处时，可用探针探及确认，窝沟处探入深度

约1mm.好发于乳牙窝沟、邻面和颈部； 度龋：指牙本质龋
坏明显，窝沟处探针探入深度约2mm.龋坏与髓腔间有正常牙
本质，感染未涉及牙髓，治疗时不需处理牙髓； 度龋：是

龋坏致牙髓暴露、髓腔穿通，有牙髓病症状或牙已变色。治
疗时需作牙髓切断、牙髓摘除或根管治疗； 度龋：指龋坏
致牙冠组织崩溃状，成残冠或残根。牙髓组织早已感染。乳

牙有时虽牙冠明显崩溃，损坏范围亦广，但仍保持正常牙髓
。这种情况实属于 度龋，是龋坏停止或呈缓慢地进展所致
。牙本质呈暗褐色，表面较硬，即停止性龋。近年来，对婴

幼儿期所发生的上颌乳前牙、乳磨牙等多个龋齿现象，称为
婴幼儿龋（early childhood caries，ECC），有儿童早期龋病的
含义。相关推荐：#0000ff>2011年口腔助理医师：切削对乳

牙的影响 #0000ff>2011年口腔助理医师：药物性牙龈增生
#0000ff>2011年口腔助理医师：乳牙牙髓 特别推荐：
#0000ff>2011年口腔助理医师考试时间 #0000ff>考试大纲

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问
www.100test.com