

2011年口腔外科：六类智齿应尽早拔掉 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/654/2021_2022_2011_E5_B9_B4_E5_8F_A3_c22_654784.htm

六类必须拔掉的智齿包括蛀牙、侵犯邻牙、空间不足、不易清洁、没有对咬牙、阻生齿。遇到六种情况，智齿必须拔掉。什么样的智齿可以保留，什么样的智齿必须拔掉呢？朱保玉介绍：（一）可保留的智齿

- 1.智齿生长的位置和方向正常。
- 2.智齿没有出现蛀牙，智齿冠周软组织没有发炎和疼痛史。
- 3.有对咬牙。

（二）必须拔掉的智齿

- 1.蛀牙：如果智齿出现比较深的蛀牙，特别是需要根管治疗的，一律建议拔掉。
- 2.侵犯邻牙：如果生长空间不足，智齿会使劲儿顶住相邻的牙齿继续生长，可能导致两颗牙齿都保不住。
- 3.空间不足：如果智齿生长空间不足，在智齿生长过程中，会出现比较严重的牙龈肿胀、牙齿疼痛等症状。
- 4.不易清洁：如果智齿长得歪七扭八，清洁起来会比较困难，很容易出现蛀牙。
- 5.没有对咬牙：不是每个人的四颗智齿都会顺利生长出来，如果一颗智齿的对面没有与之相抗衡的另一颗智齿，可能影响人的咬合关系。
- 6.阻生齿：这种类型的智齿，通常埋在齿槽骨的里面，当你感觉到痛时，就要拔掉它。

必须拔掉的智齿，在牙根尚未完全形成时就该拔掉。有些人的智齿早就该拔掉了，但是他们认为只要智齿没有引起疼痛，就不必治疗或拔除。“这种看法是不对的。”朱保玉说，一旦出现牙痛等症状，就表明智齿的存在已经对其他牙齿造成了不可逆转的损害，此时再拔掉智齿，多少有点儿亡羊补牢的意思。还有些人害怕拔牙疼痛而迟迟不愿到牙科就诊。“其实，在局部麻醉下，患者在拔牙过程中是不会

感觉到疼痛的。”朱保玉说，在智齿刚刚萌出、牙根尚未完全形成时，就应该拔掉该拔的智齿。 小编推荐：

#0000ff>2011年口腔外科：种植义齿的维护 #0000ff>2011年口腔外科考点：什么是干槽症 #0000ff>口腔外科考点：牙龈外露整形方法简单 特别推荐： #ff0000>2011口腔执业医师考试大纲 #0000ff>考试时间 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com