

公卫基础理论：流行性斑疹伤寒典型表现 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/654/2021_2022__E5_85_AC_E5_8D_AB_E5_9F_BA_E7_c22_654876.htm

流行性斑疹伤寒典型表现：疲乏、头痛、头晕、畏寒、低热、眼结膜及脸部充血等。潜伏期5~21天，平均为10~12天。少数患者有2~3日的前驱症状，如疲乏、头痛、头晕、畏寒、低热等。大多起病急骤，伴寒战、剧烈持久头痛、周身肌肉疼痛、眼结膜及脸部充血等。

- 1.发热体温于第2~4天即达高峰（39~40 以上），第1周呈稽留型，第2周起有弛张趋势。热程通常为14~18日，热度于2~4天内迅速退至正常。近年来报告的病例中，其热型多为弛张或不规则，可能与抗生素的应用有关。
- 2.皮疹为重要体征，见于80%以上的病例，于病程第4~6天出现，初见于胸、背、腋窝、上臂两侧等处，一天内迅速发展至全身。面部通常无疹，下肢皮疹也较少。疹呈圆形或卵圆形，直径约2~4mm，初为鲜红色斑丘疹，按之退色，继转为暗红色或瘀点样。皮疹于5~7天消退，瘀点样疹可持续1~2周，遗有棕黄色斑或有脱屑。
- 3.神经系症状明显，且很早出现，表现为惊恐、兴奋、剧烈头痛，发病时可伴神志迟钝、谵妄，偶有脑膜刺激征、肌肉和舌震颤、昏迷、大小便失禁、吞咽困难、听力减退等。
- 4.心血管系症状心率增速与体温升高一般成正比，有中毒性心肌炎时可出现奔马律、心律失常等。休克或低血压乃失水、微循环障碍、心血管及肾上腺功能减退等的综合后果。
- 5.其他症状尚有咳嗽、胸痛、呼吸急促、恶心、呕吐、纳减、便秘、腹胀等，偶有黄疸、发绀、肾功能减退。脾大多轻度肿大，部分病例有肝肿大。相关

推荐：#0000ff>公卫基础理论：定期健康检查 #0000ff>2011公
卫理论考点：茶水煮米饭能防癌 #0000ff>公卫考点：机体免
疫系统的组成及其功能 特别推荐：#0000ff>2011年公卫助理
医师考试时间 #0000ff>考试大纲 100Test 下载频道开通，各类
考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com