

2011年公卫助理：人血免疫球蛋白 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/654/2021_2022_2011_E5_B9_B4_E5_85_AC_c22_654884.htm

【性状】本品为无色或黄色澄清液体，可带乳光。**【药理作用】**注射免疫球蛋白是一种被动免疫疗法。它是把免疫球蛋白内含有的大量抗体输给受者，使之从低或无免疫状态很快达到暂时免疫保护状态。由于抗体与抗原相互作用起到直接中和毒素与杀死细菌和病毒。因此免疫球蛋白制品对预防细菌、病毒性感染有一定的作用。**【药代动力学】**人免疫球蛋白的生物半衰期为16~24天。

【适应症】主要用于预防麻疹和传染性肝炎。若与抗生素合并使用，可提高对某些严重细菌和病毒感染的疗效。**【用法用量】**用法：只限于肌肉注射，不得用于静脉输注。用量：
1.预防麻疹：为预防发病或减轻症状，可在与麻疹患者接触7日内按每kg体重注射0.05~0.15ml，5岁以下儿童注射1.5~3.0ml，6岁以上儿童最大注射量不超过6ml。一次注射预防效果通常为2~4周。
2.预防传染性肝炎：按每kg体重注射0.05~0.1ml或成人每次注射3ml，儿童每次注射1.5~3ml，一次注射预防效果通常为一个月左右。**【不良反应】**一般无不良反应，少数人会出现注射部位红肿、疼痛反应，无需特殊处理，可自行恢复。**【禁忌】**1.对免疫球蛋白过敏或有其他严重过敏史者。2.有IgA抗体的选择性IgA缺乏者。**【注意事项】**1.本品出现混浊，有摇不散的沉淀、异物或玻璃瓶有裂纹、过期失效、均不可使用。2.开瓶后应一次注射完毕，不得分次使用。3.运输及贮存过程中严禁冻结。**【孕妇及哺乳期妇女用药】**尚不清楚。**【药物相互作用】**应单独使用。**【规格】**

】150mg/瓶、300mg/瓶【贮藏】2~8 避光保存 相关推荐：
#0000ff>2011年公卫助理医师：流行性乙型脑炎 #0000ff>2011
年公卫助理医师：乙肝的预防与治疗 #0000ff>2011年公卫助理
：结核病人接触者预防 特别推荐： #0000ff>2011年公卫助理
医师考试时间 #0000ff>考试大纲 100Test 下载频道开通，各类
考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com