

中药词典：两头尖 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/654/2021_2022__E4_B8_AD_E8_8D_AF_E8_AF_8D_E5_c22_654951.htm

两头尖为毛茛科银莲花属植物多被银莲花的干燥根茎。有祛风湿，消痈肿的功效。两头尖【英文名】RHIZOMA ANEMONES

RADDEANAE【别名】红背银莲花、红被银莲花【来源】本品为毛茛科银莲花属植物多被银莲花

Anemone raddeana Regel的干燥根茎。夏季采挖，除去须根，洗净，干燥。【性状】本品呈类长纺锤形，两端尖细，微弯曲。其中近一端处较膨大。长1~3cm，直径2~7mm。表面棕褐色至棕黑色，具微细纵皱纹，膨大部位常有1~3个支根痕呈鱼鳍状突起，偶见不明显的3~5环节。质硬而脆，易折断，断面略平坦，类白色或灰褐色，略角质样。无臭，味先淡后微苦而麻辣。【鉴别】

(1)本品横切面：表皮细胞1列，切向延长，外壁增厚。皮层由10余列类圆形薄壁细胞构成。维管束外韧型，10余个排成环状，韧皮部细胞皱缩，木质部导管6~24个，形成层不明显。射线宽阔，髓部较大，为类圆形薄壁细胞构成。薄壁细胞充满淀粉粒。粉末灰褐色。淀粉粒众多，单粒类圆形或椭圆形，直径2~11 μ m，脐点点状或短缝状，层纹不明显；复粒由2~4分粒组成。表皮细胞红棕色、黄色或亮黄色，外壁木栓化增厚，常呈脊状或瘤状突入细胞内。网纹、螺旋或梯纹导管多见，直径10~33 μ m，少有具缘纹孔导管。(2)取本品粗粉2g，加甲醇10ml，置水浴上微温，振摇10分钟，滤过，取滤液2ml，加1%氢氧化钠溶液2ml，置水浴上加热3分钟，溶液呈澄明的鲜黄色，再加1%盐酸溶液使成酸性，溶

液鲜黄色消褪，生成乳白色混浊。（3）取本品粗粉1g，加70%乙醇10ml，置水浴上微沸10分钟，滤过，取滤液2ml，蒸干，加醋酐1ml使溶解，沿壁缓缓加入硫酸，界面即显紫红色，放置，上层显污绿色。【性味归经】辛，热；有毒。归脾经。【功能主治】祛风湿，消痈肿。用于风寒湿痹，四肢拘挛，骨节疼痛，痈肿溃烂。【用法用量】1.5～3g.外用适量。【贮藏】置阴凉干燥处。相关推荐：#0000ff>红花鹿蹄草 #0000ff>野西瓜苗子 #0000ff>八角莲 特别推荐：
#0000ff>2011年中医助理医师考试大纲 #0000ff>考试时间
100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问
www.100test.com