

2011年口腔修复学：即刻义齿戴入的注意事项 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/654/2021_2022_2011_E5_B9_B4_E5_8F_A3_c22_654964.htm 即刻义齿完成后，即可外科手术拔牙，修整牙槽骨，以尽量减少组织创伤和保留骨组织为原则。即刻义齿完成后，即可外科手术拔牙，修整牙槽骨，以尽量减少组织创伤和保留骨组织为原则。外科手术完成后，从消毒液内取出义齿，用生理盐水冲洗干净，戴入病人口中，如义齿不能就位和有疼痛时，可适当调改，初步调牙合，嘱病人戴义齿后的注意事项和复诊时间。

- 1.戴义齿后24h内最好不摘下义齿，以免血块形成。术后组织有水肿现象，摘下义齿后再戴就比较困难，如伤口疼痛，可服用镇痛药或局部冷敷。
- 2.初戴24h之内吃流质或半流质食物，以免刺激伤口，造成疼痛。
- 3.次日来院复查，摘下义齿，用温盐水冲洗伤口，了解病人戴用义齿情况，修改压痛区和调整咬殆。
- 4.5天后拆线，再检查和修改义齿。
- 5.嘱病人定期进行复查。因牙槽骨吸收，基托与牙槽嵴之间出现间隙，义齿固位力降低、不稳定，产生压痛、咀嚼功能减低等症状时，应及时进行重衬和调整咬殆。

Lam发现，拔牙后一个月上颌前部牙槽嵴快速吸收，中度吸收持续到拔牙5个月后。Wic-torin观察8-12个月之前剩余牙槽嵴达到稳定形状，即刻义齿戴后在5-6个月时，要求进行暂时性重衬和调牙合，在拔牙后8-12个月时，要求进行重衬或重新修复。

小编推荐：#0000ff>2011年口腔执业医师：楔状缺损牙 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com