

2011年公卫助理医师：卡介苗接种反应如何处理 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/655/2021_2022_2011_E5_B9_B4_E5_85_AC_c22_655049.htm 局部出现水疱或脓疱：出现小水疱或小脓疱，可用0.2%安尔碘涂抹，使其收干结痂；发生大水疱或大脓疱，先用灭菌注射器抽取渗液后再涂0.2%安尔碘，必要时可用5%硼酸软膏涂敷，严防继发感染。局部溃疡：可用异烟肼粉（如无粉剂，可用异烟肼药片压碎成粉末使用）撒于溃疡面，用无菌纱布包扎；如有混合感染时，可撒些消炎药粉并用无菌纱布包扎，视溃破情况，可每日或隔1 - 2日换药1次，换药前用3%硼酸溶液或盐水冲洗溃疡面。淋巴结肿大超过1.0cm，皮色正常未形成溃疡时：局部可适当热敷，每日3 - 4次，10分钟，早期热敷常能使肿大的淋巴结自行消散。同时口服异烟肼，剂量为10mg/kg体重，每日1次，直到淋巴结缩小稳定时止，一般服3 - 4个月。若局部淋巴结继续增大，可口服异烟肼小儿每日按体重8 - 10mg/kg，一日总量不超过0.3g，顿服，或加用利福平；局部用异烟肼粉末或加用利福平涂敷，疔好采用油纱布，起初每天换药1次，好转后改为2 - 3天换药1次。大龄儿童可以采用链霉素局部封闭。淋巴结有波动感，皮色暗红色，提示脓疡形成：可在局麻下用粗针头将脓液抽出，用异烟肼液（5%异烟肼溶液2ml）冲洗，同时注入链霉素10mg/kg，必要时隔7 - 10天重复抽脓、冲洗，如无脓液抽出则可停止。抽脓、冲洗治疗过程中，暂时停药异烟肼，待脓液排净后，再口服异烟肼（剂量同前）6 - 8周。此时应禁止热敷（因易致破溃）和切开引流（因不易收口）。淋巴结有溃破倾向时：应及时切开引流，因为切开

引流的切口常较自然破溃的破口整齐，引流通畅，愈合较快。已溃破时，应作扩创术。两者都需将坏死组织彻底刮除，再用凡士林纱布蘸链霉素粉、异烟肼粉或碘信甘油作引流，并用5%异烟肼软膏或20%对氨基水杨酸钠软膏外敷，每2 - 3天换药1次，直到创口愈合为止。局部溃疡或淋巴结溃疡在治疗时，如肉芽组织生长过多，会影响创面愈合，可用枯矾少许撒于创上包好，创即成清洁的较浅溃疡，再以1%金霉素软膏外敷，创面渐平，且肉芽组织不再增生而收口。也可用硝酸银棒腐蚀或剪除，在创面上撒对水氨基水杨酸钠粉亦可。

窦道型：如淋巴结溃成瘻时，可用5%异烟肼软膏或20%对水氨基水杨酸钠软膏局部涂敷，通常1 - 3个月方可痊愈。

相关推荐：[#0000ff>2011年公卫助理医师：流行性乙型脑炎](#)
[#0000ff>2011年公卫助理医师：乙肝的预防与治疗](#)
[#0000ff>2011年公卫助理：结核病人接触者预防](#) 特别推荐：
[#0000ff>2011年公卫助理医师考试时间](#) [#0000ff>考试大纲](#)
100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问
www.100test.com