

2011年口腔外科：口腔颌面部创伤包扎运送 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/655/2021_2022_2011_E5_B9_B4_E5_8F_A3_c22_655136.htm 1.包扎其作用有： 压迫止血；

暂时性固定，减少骨折段活动，防止进一步移位； 保护并缩小创口，减少污染或唾液外流。常用的包扎法有：单眼包扎法、四尾带包扎法和十字绷带包扎法。包扎颌面部时应注意松紧度适当。不要压迫颈部以免影响呼吸，颈部不要过紧以免影响皮肤血液循环。 2.运送运送患者时应注意保持呼吸道通畅。昏迷患者可采用俯卧位，额部垫高，使口鼻悬空，有利于唾液外流和防止舌后坠。一般患者可采取侧卧位或头侧向一侧，避免血凝块及分泌物堆积在口咽部。运送途中，应随时观察伤情变化，防止窒息和休克发生。搬运疑有颈椎损伤的患者时，应多人同时搬运，一人稳定头部并加以牵引，其他人则以协调的力量将患者平直整体移动，抬到担架上，颈部应放置小枕，头部两侧加以固定，防止头的摆动。 小编推荐：[#0000ff> 100Test 下载频道开通](#)，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com