

2011年公卫执业医师：肾结石的信号 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/655/2021_2022_2011_E5_B9_B4_E5_85_AC_c22_655161.htm

疼痛和血尿是肾结石的主要症状。疾病的症状就是告知疾病产生的信号，肾结石作为泌尿系结石中最为常见的疾病，朋友们可要警惕这些肾结石的信号了，这些显示了肾结石的信号有：肾结石的症状取决于结石的大小，引起梗阻的程度和有无继发感染。在肾盂中不活的结石而又无感染时，可长期无症状，甚至结石已引起肾功能不足时还无自觉症状，只在摄腹部X线照片时偶然发现。

但大多数患者有症状。疼痛和血尿是肾结石的主要症状。

约75%肾结石患者有腰痛。结石较大，在肾盂中移动度较小时，疼痛多为钝痛，有时是隐痛。结石小，在肾盂内移动度大时。容易引起肾盂输尿管联接部的梗阻而出现肾绞痛。肾绞痛是一种突然发生的严重疼痛，从腰部开始，沿输尿管向下放射至膀胱。痛呈阵发性，一般持续数分钟，亦可长达数小时，并有恶心呕吐，有时病人面色苍白，大汗淋漓，呈虚脱状态。血尿是第二个重要症状，疼痛和血尿相继出现是肾和输尿管结石的特点；尤其是体力活动较多时，如劳动、运动、骑马和乘车时突然发生疼痛和血尿。但血尿一般较轻，有时肉眼不能看出，但几乎每个病例都能在显微镜下见到从少数到多数红细胞，因此尿的显微镜检查很重要。一部分患者在临床上并无结石病的典型疼痛及血尿，而因泌尿系感染的症状就医。在这一类患者中如不追究引起感染的原发病因，不做泌尿系平片及静脉泌尿系X线造影检查，就容易忽略结石的存在。肾结石患者偶有排出结石或小砂粒的病史，这

就有助于诊断。双侧肾结石引起梗阻或患者唯一的肾（例如另一肾已切除）发生梗阻，可出现急性无尿。有时由于肾一肾反射，一例肾结石可引起对侧腰痛。单侧肾结石梗阻也可以引起急性无尿。发现这些肾结石的信号，必须引起重视，及时到医院做一下检查，如果患有肾结石，就要尽快治疗，不要让其恶化，对身体造成更大的危害。相关推荐：

#0000ff>2011年公卫执业医师：环境的区域性 #0000ff>2011年公卫执业医师：生物浓缩 #0000ff>2011年公卫执业医师：辐照食品的管理 特别推荐： #0000ff>2011年公卫执业医师考试时间 #0000ff>考试大纲 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com